




農林水産省「稲発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」に
掲載された農業です。

三井東圧

浸透移行性殺虫剤



アルパリン®

顆粒水溶剤

アルパリンはアグロ カネシヨウ株式会社の登録商標です。



適用拡大!!

【作物名の追加】 さとうきび 【使用方法の追加】 かぼちゃ：灌注

【適用害虫名の追加】

- ・トマト、ミニトマト：カメムシ類
- ・ほうれんそう：ウリハムシモドキ
- ・かんしょ：アブラムシ類
- ・とうがらし類：ナスミバエ
- ・かき：アザミウマ類(類表示への変更)

(2018年11月21日の拡大登録内容より抜粋)

野菜等の
登録は裏面を
ご覧ください。

果樹・野菜・水稻・茶・花きの多様な場面で活躍します!

■適用害虫及び使用方法(水稻・果樹・茶・さとうきび・てんさい・だいず・あずき・えだまめ・花き・樹木類・水田作物・畑作物(休耕田)・いね科牧草)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
稲	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	7日前			4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000					
りんご	アブラムシ類 キンモンホンガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類				3回以内		3回以内
もも ネクタリン	モモチョッキリソウムシ アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類						3回以内
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類				2回以内		2回以内
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウコクナシキジラミ	2000					3回以内
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類					4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)	4回以内
マンゴー	チャノキロアザミウマ			前日		散布	
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類		200~700ℓ/10a				3回以内
ぶどう	カメムシ類 ブドウトラカミキリ フタテンヒメヨコバイ	3000					
かんきつ	チャノキロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000~2000					3回以内
	ゴマダラカミキリ	1000					
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ アオバハコロモ	2000					
	あけび(果実)	2000					
キウイフルーツ	カメムシ類	1000~2000			3回以内		3回以内
びわ	カメムシ類 ビワキジラミ	2000		前日		2回以内	2回以内
オリーブ	カメムシ類					2回以内	2回以内
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50	100mℓ/株	育苗期	5回以内	株元灌注	5回以内

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
茶	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2000	200~400ℓ/10a	摘採7日	2回以内		2回以内
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコバネナガカメムシ		100~300ℓ/10a	収穫45日前	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ	2000~3000 1000~2000		7日	2回以内		3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
だいず	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100~200	5ℓ/ペーパーポット6冊(2.5ℓ/m ²)	移植前	1回	灌注	3回以内
	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100~240	6ℓ/ペーパーポット6冊(3ℓ/m ²)				
あずき	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	2000 3000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内		3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	2000			3回以内	散布	2回以内
えだまめ	アブラムシ類 ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 ハモグリバエ類 フタスジヒメハムシ	2000 3000					2回以内
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	2000~3000 1000	1ℓ/m ²	発生初期		灌注	5回以内 (土壌混和は1回以内)
きく	アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類	2000~3000 2000	100~300ℓ/10a		5回以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	ハモグリバエ類	1000~2000	1ℓ/m ²			灌注	
樹木類(つつし類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000	100~700ℓ/10a	発生初期		散布	5回以内
つばき類	チャドクガ	100	0.5~2ℓ/樹(但し、220ℓ/10aまで)		2回以内	株元灌注	5回以内 (株元灌注は2回以内)
つつし類	ツツシグンバイ ケムシ類		100~300ℓ/10a		5回以内		5回以内
水田作物、畑作物(休耕田)*	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	-		散布	3回以内
いね科牧草	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	7日			3回以内

★ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20~40g/樹	発芽前~発芽期	1回	本剤1g当り水1mℓの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
ぶどう	クビアカスジカバ	40g/樹	幼果期まで但し、 収穫30日前まで			3回以内 (塗布は1回以内)

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2018年11月21日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

ABW1W01V



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>

■適用害虫及び使用方法（野菜）

（2018年11月21日付拡大登録内容を含む）

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
とうもろこし(子実)	ムギクヒレアブラムシ、カメムシ類			前日	3回以内		3回以内
未成熟とうもろこし	アブラムシ類、カメムシ類						
ばれいしょ	ワタアブラムシ	2000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	アブラムシ類、コナジラミ類			3日	1回		1回
トマト ミニトマト	カメムシ類	2000~3000		前日	2回以内		
	コナジラミ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	鉢上時又は定植時	1回	灌注	
ブロッコリー	アブラムシ類、コナガ						
	アブラムシ類	2000~3000		3日			
ピーマン なす	コナジラミ類	2000~3000					
	アブラムシ類	3000					
	アザミウマ類、カメムシ類	2000					
とうがらし類	コナジラミ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	前日	2回以内	散布	下表参照***
	アブラムシ類	3000					
	アザミウマ類、ナスミバエ	2000					
とうがらし(葉)	コナジラミ類	2000~3000					
	アブラムシ類	3000		14日			
	アザミウマ類	2000					
かぼちゃ	アブラムシ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	
ズッキーニ		2000					
きゅうり	コナジラミ類、アブラムシ類	2000~3000		前日			
	アザミウマ類、ウリハムシ、カメムシ類	2000					
きゅうり(葉)	コナジラミ類、アブラムシ類	3000		3日			2回以内
きゅうり(花)				前日			
すいか	アブラムシ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	下表参照***
まくわうり		3000					2回以内
メロン	コナジラミ類	2000~3000		3日			
	アザミウマ類	2000					
	アブラムシ類	3000					
うり類(漬物用)	コナジラミ類、アザミウマ類	2000		7日			
	アブラムシ類	2000~3000					
にがうり	コナジラミ類			前日			
セルリー	アブラムシ類	2000		14日			
キャベツ	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ	50~100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	下表参照***
	アブラムシ類	2000~3000					
はくさい	キスジノミハムシ	2000		3日			
	アブラムシ類	2000~3000		2回以内			
だいこん	キスジノミハムシ	1000		7日			
	アブラムシ類	2000~3000	100~300ℓ/10a			散布	
わさび				育苗前期			
畑わさび	アブラムシ類、ナトビハムシ	2000		3回以内			3回以内
クレソン	アブラムシ類	3000		3日			
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ	50					
	アブラムシ類、ナモグリバエ	50~100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊当り0.5ℓ**	定植前日~定植時	1回	灌注	
ねぎ	アザミウマ類、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、タネバエ、ネギコガ	50					下表参照***
		2000	100~300ℓ/10a	3日	2回以内	散布	
	アザミウマ類	1000	1ℓ/m ²				
	ハモグリバエ類、トビイロヒョウタンソウムシ	400	0.4ℓ/m ²	生育期但し、14日	1回	株元灌注	
	クロバネキノコバエ類	1000	1ℓ/m ²				

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
わけぎ	アザミウマ類	2000	100~300ℓ/10a	3日	2回以内	散布	
	ハモグリバエ類	400	0.4ℓ/m ²	生育期但し、14日	1回	株元灌注	下表参照***
にら	ネギアザミウマ						
	アブラムシ類		100~300ℓ/10a		2回以内		
アスパラガス	アザミウマ類、ジュウシホシクビナガハムシ、コナジラミ類、カメムシ類	2000	100~800ℓ/10a	前日	3回以内	散布	3回以内
にんじん	アブラムシ類		100~300ℓ/10a	7日	2回以内		
	トビイロヒョウタンソウムシ、クロバネキノコバエ類	400	0.4ℓ/m ²	生育期但し、21日	1回	株元灌注	
しゅんぎく	アブラムシ類	3000		前日			
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	2000					下表参照***
	アブラムシ類						
ほうれんそう	アブラムシ類、ウリハムシモドキ						
非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)なばな類かぶ	アブラムシ類	3000		3日			
	キスジノミハムシ	2000					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟さざげを除く)	アブラムシ類、ハモグリバエ類			7日	2回以内		2回以内
未成熟さざげ							
さやいんげん	コナジラミ類	2000					下表参照***
	アブラムシ類、ハモグリバエ類、ウラナミシジミ			前日			
さやえんどう、実えんどう							
モロヘイヤ	アザミウマ類						2回以内
オクラ	アブラムシ類						下表参照***
らっきょう	アザミウマ類					3回以内	3回以内
しょうが	クロバネキノコバエ類		100~300ℓ/10a			散布	3回以内
バジル	コナジラミ類、アブラムシ類						2回以内
しそ	アブラムシ類、ウリハムシモドキ						下表参照***
しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)しそ(花穂)アマランサス(茎葉)	アブラムシ類						
しよくようほおすき食用ミニバラ食用カーネーション食用金魚草食用パンジー食用トレニア食用なでしこ食用エキザカム食用せんじちう	アブラムシ類、コナジラミ類	3000		3日	2回以内		2回以内
食用ぎく				7日			下表参照***
なんてん(葉)	アブラムシ類			3日			2回以内
すいぜんじな				3日			
ふぎ	コナジラミ類	2000		7日			下表参照***
せり※	アブラムシ類					3回以内	3回以内
せり(水耕栽培)※※				3日			

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。 **セル成型育苗トレイ、ペーパーポットは30×60cm用土壌1.5~4.0ℓ(トマト、ミニトマト、ブロッコリー、かぼちゃ、レタス、非結球レタス、ねぎ)、約3ℓ(キャベツ)

**適用場所:水田 ※適用場所:ガラス室等の施設

***ジノテフランを含む農薬の総使用回数

きゅうり とうがらし類 すいか	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	トマト ミニトマト	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	かぶ、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、なばな類、ほうれんそう	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
にがうり、うり類(漬物用)、食用ぎく、セルリー、とうがらし(葉)、しそ	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ブロッコリー	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	だいこん	5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)
かぼちゃ	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	はくさい	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	チンゲンサイ しゅんぎく	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
ズッキーニ	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ねぎ	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	オクラ、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、しょうが	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)
なす ピーマン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	わけぎ	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	にんじん	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)
メロン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	にら	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	ふぎ	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
		レタス 非結球レタス	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)		

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。○容器・空袋などは農場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記載しましょう。