

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

| 作物名            | 適用病害虫名                              | 使用量   | 使用時期   | 本剤の使用回数 | 使用方法                 | プロバナゾールを含む農薬の総使用回数                |
|----------------|-------------------------------------|---|--|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 稲              | いもち病                                | 3kg/10a   | 移植時  | 1 回     | 側条施用                 | 2 回以内<br>(移植時<br>までの処理は<br>1 回以内) |
|                |                                     | 3~4kg/10a                                       | 葉いもちには初発の 10 日前~初発時<br>穂いもちには出穂<br>3~4 週間前<br>収穫 14 日前まで | 2 回以内   | 散布                   |                                   |
|                | 移植活着後及び<br>出穂 3~4 週間前<br>収穫 14 日前まで |   |  |         |                      |                                   |
|                | 白葉枯病<br>もみ枯細菌病                      |   | 出穂 3~4 週間前<br>収穫 14 日前まで                                 |         |                      |                                   |
|                | 穂枯れ<br>(ごま葉枯病菌)                     |   | 出穂 3~4 週間前<br>収穫 14 日前まで                                 |         |                      |                                   |
| 稲<br>(箱育苗)     | いもち病<br>白葉枯病<br>もみ枯細菌病              | 育苗箱<br>(30×60×3cm、<br>使用土壌約 5L)<br>1 箱当り 20~30g | 移植 3 日前~<br>移植前日   | 1 回     | 育苗箱の苗の上か<br>ら均一に散布する | 1 回                               |
| きゅうり           | 斑点細菌病                               | 6~7.5kg/10a<br>(5g/株)                           | 定植時  |         | 植穴土壌混和               |                                   |
| レタス<br>非結球レタス  | 腐敗病<br>斑点細菌病                        | 6~9kg/10a                                       |  |         | 土壌混和                 |                                   |
| キャベツ           | 黒腐病                                 |   |  |         | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和   |                                   |
| ひろしまな          | 軟腐病                                 |   |  |         | 全面土壌混和               |                                   |
| はくさい           |                                     | は種時又は定植時  |  |         |                      |                                   |
| ピーマン<br>とうがらし類 | 斑点病<br>うどんこ病                        | 5~10g/株   | 定植時  |         | 植穴土壌混和               |                                   |
| ブロッコリー         | 黒腐病                                 | 6~9kg/10a                                       |  |         | 全面土壌混和               |                                   |
| カリフラワー         | 軟腐病                                 | 6kg/10a   | 生育期 但し、<br>収穫 35 日前まで                                    |         | 株元散布                 |                                   |
| わけぎ            |                                     |   | 6~9kg/10a  |         |                      |                                   |
| あさつき           |                                     | 6kg/10a   | 土寄せ時 但し、<br>収穫 30 日前まで                                   | 2 回以内   |                      |                                   |
| ねぎ             |                                     |   |  |         | 2 回以内                |                                   |