

2020年12月23日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|-------|--|-------|----------------|----------|---------|------------|--------------------|---|
| キャベツ | べと病 株腐病 菌核病 | 1000倍 | 100～300 L /10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 (は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内) |
| はくさい | 黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病 | | | 収穫7日前まで | | | | 3回以内 (は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| メロン | べと病 うどんこ病 つる枯病 | | | 収穫3日前まで | 5回以内 | | | |
| すいか | うどんこ病 つる枯病 炭疽病 菌核病 | | | 収穫前日まで | | | | |
| きゅうり | べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病 | | | 収穫7日前まで | | | | |
| かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 | 16倍 | 1.6 L /10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | |
| トマト | 疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病 | 1000倍 | 100～300 L /10a | 収穫前日まで | | | | 散布 |
| ミニトマト | 斑点病 | | | 2回以内 | 2回以内 | | | |

2020年12月23日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|--------|---|--------------|-------------------|------------------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| なす | うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病 褐色円星病 | 1000倍 | 100~300 L /10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 黒枯病 斑点病 | | | 3回以内 | | | | |
| たまねぎ | べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 | | | 収穫7日前まで | 4回以内 | | 4回以内 | 6回以内 |
| アスパラガス | 茎枯病 斑点病 褐斑病 | | | 収穫前日まで | | | | 4回以内 |
| ねぎ | べと病 さび病 白絹病 葉枯病 黒斑病 小菌核腐敗病 | | | 収穫14日前まで | 2回以内 | | 4回以内 (株元灌注は2回以内、散布は2回以内) | 4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| レタス | べと病 菌核病 すそ枯病 灰色かび病 | | | 3回以内 | 3回以内 | | 3回以内 | 5回以内 (土壌灌注は2回以内、散布は3回以内) |
| リーフレタス | | | | 収穫21日前まで | | | | |
| ブロッコリー | 菌核病 べと病 | | | 出蕾前 但し、 収穫21日前まで | 2回以内 | | 3回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| きく | 白さび病 | 発病前~ 発病初期 | 3回以内 | 6回以内 | | | | |