

2019年12月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
キャベツ	べと病 株腐病 菌核病	1000 倍	100~300 L /10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内	3 回以内 (は種又は定 植前の土壌 混和は1回 以内、散布 及びエアゾ ル剤の噴射は 合計2回 以内)
はくさい	黒斑病 白斑病 白さび病 べと病 菌核病			収穫 7 日 前まで				3 回以内 (は種又は定 植前の土壌 混和は1回 以内、散布は 2回以内)
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病			収穫 3 日 前まで	5 回以内			
すいか	うどんこ病 つる枯病 炭疽病 菌核病							
きゅうり	べと病 うどんこ病 灰色かび病 褐斑病 炭疽病 黒星病			収穫前日 まで	3 回以内			10 回以内 (土壌灌注は 2回以内、散 布及び常温 煙霧及びく ん煙及びエア ゾル剤の噴 射は合計 8回以内)
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病			収穫 7 日 前まで				3 回以内
トマト	疫病 うどんこ病 灰色かび病 葉かび病 すすかび病			収穫前日 まで	2 回以内			6 回以内 (土壌灌注は 2回以内、散 布及びくん 煙及びエアゾ ル剤の噴射 は合計4回 以内)
ミニトマト	斑点病							2 回以内
なす	うどんこ病 灰色かび病 すすかび病 菌核病 黒枯病			3 回以内	4 回以内			

2019年12月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
ピーマン	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 黒枯病 斑点病	1000倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病			収穫7日前まで	4回以内		4回以内	6回以内
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病			収穫前日まで				
ねぎ	べと病 さび病 白絹病 葉枯病 黒斑病 小菌核腐敗病			収穫14日前まで	2回以内		4回以内 (株元灌注は2回以内、散布は2回以内)	4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)
レタス	べと病 菌核病 すそ枯病 灰色かび病			3回以内	3回以内		5回以内 (土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)	
リーフレタス				収穫21日前まで				2回以内
ブロッコリー	菌核病 べと病			出蕾前 但し、 収穫21日前まで	2回以内		3回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は2回以内)	
きく	白さび病			発病前～ 発病初期	3回以内		6回以内	