


水稲用中・後期処理除草剤

トドメバスターMF[®]

液剤

枯らそうぜ、水田雑草。



メタミホップ配合



高葉齢のノビエに!



ノビエ



ホタルイ



コナギ



クログワイ



三井化学アグロ株式会社

[®] は科研製薬(株)の登録商標



高葉齢のノビエに!

トドメバースMF[®]

液剤

特長

- 1 高葉齢のノビエに卓効のメタミホップと、広葉雑草に効果の高いベンタゾン配合した茎葉処理除草剤です。
- 2 生育の進んだ各種雑草に対して高い効果が期待できます。
- 3 除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
- 4 残ってしまった各種雑草に対してのレスキュー剤です。

農林水産省登録 第24369号 有効成分:ベンタゾン……18.3% メタミホップ………1.2%
 人畜毒性:普通物※ ※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■適用雑草と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農業の総使用回数制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数※	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稲	一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ	移植後15日～ ノビエ5葉期 但し、 収穫50日前まで	1000ml/ 10a	100ℓ/ 10a	本剤……………2回 ベンタゾンを含む農業…2回 メタミホップを含む農業…3回 (乳剤及び液剤は合計2回)	落水散布 又は ごく浅く 湛水して散布

■各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	5葉期まで
ホタルイ	花茎20cmまで
ヘラオモダカ ウリカワ	6葉期まで
ミズガヤツリ	8葉期まで
クログワイ	草丈20cmまで
コウキヤガラ	草丈30cmまで
ヒルムシロ	発生盛期まで
セリ	増殖期まで

雑草が上記葉齢を超えない時期に散布して下さい。

⚠️効果・薬害等の注意

- 散布液は所定の濃度に調製し、使いきる。
- 散布する前に落水状態にして水の出入りを止め、まきむらのないように均一に散布する。また、水を落とすことができない所では、漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態(雑草が水面上に出る状態)にして、まきむらのないように均一に散布する。
- 散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水、かけ流しはしない。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
- クログワイ、コウキヤガラ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- 重複散布は薬害のおそれがあるのでさける。
- 高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさける。
- 苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはいねいに行い、フラクズなどの浮遊物はできるだけ取り除く。また、未熟有機物を施用した場合は特にいねいに行う。
- 以下の水田では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
 - 1) 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - 2) 軟弱徒長苗を移植した水田
 - 3) 極端な浅植や深植をした水田
- 薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意する。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。
 ● 空き容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。

この資料は2020年4月8日現在の登録内容に基づいたものです。



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
 ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>