

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサゾンを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病	1000～2000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	6回以内 (但し、開花期以降散布は3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)
	輪紋病、褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病	1000倍					
なし	黒斑病、黒星病 輪紋病 うどんこ病	1000～1500倍		収穫14日前まで	5回以内		5回以内 (塗布剤は2回以内、液剤は1回以内)
もも	黒星病	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内 (休眠期は1回以内)
	灰星病 ホモフシ腐敗病 うどんこ病 すすかび病 果実赤点病	1000～2000倍					
おうとう	灰星病	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		3回以内
みかん	灰色かび病	1000～2000倍		収穫前日まで			
	そうか病	1000倍					
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病	2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
かき	炭疽病、落葉病 うどんこ病 灰色かび病 すす点病 黒星病	1000～1500倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
キウフルーツ	果実軟腐病 灰色かび病 貯蔵病害(灰色かび病)	1000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	黒星病、灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病	2000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
うめ	黒星病、灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病 枝枯病						
びわ	灰斑病 灰色かび病	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
すもも	灰星病	1000～2000倍		収穫3日前まで			
マンゴー	炭疽病	1000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサリブを含む農薬の総使用回数	
あけび (果実)	うどんこ病	3000倍	200~700 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
すいか	うどんこ病 つる枯病 菌核病、炭疽病	1000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内		4回以内	
メロン	うどんこ病 つる枯病				5回以内		5回以内	
かぼちゃ	うどんこ病	1000~2000倍		収穫7日 前まで	4回以内		4回以内	
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	2000~4000倍		収穫前日 まで	7回以内		7回以内	
	褐斑病	2000倍		収穫3日 前まで	5回以内		5回以内	
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 炭疽病	2000~4000倍						
ズッキーニ	うどんこ病	2000倍		収穫前日 まで	7回以内		7回以内	
なす	すすかび病 灰色かび病 うどんこ病	3000倍		3回以内	3回以内			
アスパラガス	茎枯病、斑点病 褐斑病	1000倍		100~500 L/10a	収穫7日 前まで		5回以内	5回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病			100~300 L/10a	収穫前日 まで			
ねぎ	葉枯病 さび病 黒斑病	2000倍		収穫30日 前まで	3回以内		3回以内	
にんにく	葉枯病	1000~1500倍		収穫3日 前まで	5回以内		5回以内	
にんじん	菌核病	1000倍		収穫14日 前まで				
		黒葉枯病	—	乾燥種子 重量の 0.5%	は種前	1回	種子 粉衣	5回以内 (種子粉衣 は1回以内、 無人航空機 散布は2回 以内)
トマト	葉かび病	3000~6000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
ミニトマト	灰色かび病	6000倍			2回以内		2回以内	
キャベツ	菌核病	1000倍		収穫14日 前まで	3回以内		3回以内	
レタス	灰色かび病 菌核病	1000~2000倍						
いちご	炭疽病 うどんこ病	1000倍		育苗期 (定植前)	5回以内		10回以内 (育苗期は 5回以内、 本圃では 5回以内)	
	うどんこ病	4000倍	収穫前日 まで (生育期)					

2020年6月18日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサジンを含む農薬の総使用回数
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	うどんこ病 炭疽病 褐斑病	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	だいず	—	乾燥種子 重量の0.5%	は種前	4回以内 1回		種子 粉衣
ばれいしょ	夏疫病	500倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	5回以内	散布	5回以内
やまのいも	葉渋病	1000~2000倍					5回以内 (種いも への処理は 1回以内、 無人航空機 散布は 3回以内)
		青かび病	—	種いも 重量の1%	植付前	1回	種いも 粉衣
てんさい	斑点病 褐斑病	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日 前まで	4回以内	散布	4回以内
小麦	赤かび病	1000~2000倍	60~180 L/10a	収穫21日 前まで	3回以内 (出穂期以降 は1回以内)		4回以内 (種子への処 理は1回以 内、散布及び 無人航空機 散布は合計3 回以内、出穂 期以降は 1回以内)
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による)	1000倍	200~400 L/10a	摘採7日 前まで	2回以内		2回以内
たばこ	赤星病 うどんこ病 灰色かび病	1000~2000倍	100~180 L/10a	収穫10日 前まで			
樹木類	炭疽病	1000倍	200~700 L/10a	発病初期	3回以内		3回以内