

2020 年 6 月 30 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数		
小麦	赤さび病	2000 倍	60～150 L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
キャベツ	株腐病 根朽病		100～300 L /10a						
	菌核病								
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病								
	ブロッコリー								黒すす病
	カリフラワー								菌核病
きゅうり	灰色かび病								
	菌核病								
すいか	うどんこ病								
	つる枯病								
メロン	うどんこ病	2000～4000 倍							
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病	2000 倍							
	ミニトマト	うどんこ病	2000～4000 倍						
		灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病	2000 倍						
ピーマン	灰色かび病 黒枯病 斑点病	2000～4000 倍	1L/株	収穫前日まで	3 回以内	株元灌注	3 回以内		
	うどんこ病								
	白絹病								
なす	菌核病 すすかび病 褐色斑点病	2000 倍	100～300 L /10a			散布			
	ししとう							灰色かび病 うどんこ病	
黒枯病 斑点病									
かぼちゃ	つる枯病								
	にがうり ズッキーニ							うどんこ病	
オクラ	灰色かび病 うどんこ病								
いちご	輪斑病								
	しょうが							白星病	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオブラトを含む農薬の総使用回数
らっかせい	白絹病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病						
豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く)							
だいず えだまめ	うどんこ病						
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病						
にら	白斑葉枯病 さび病 白絹病			収穫 7 日前まで	1 回		1 回
にら(花茎)				収穫前日まで			2 回以内
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～2000 倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布は 2 回以内)
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病						
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病						
セルリー	斑点病 菌核病						
にんじん	黒葉枯病						
パセリ	うどんこ病						
しそ	灰色かび病 斑点病						
しそ(花穂)							
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病			収穫前日まで	3 回以内	3 回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病						
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病	200～700 L /10a					
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病			収穫 7 日前まで			

2020 年 6 月 30 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数			
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニア病 黒点病 すす点病 すす斑病	2000 倍	200~700 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
かんきつ	灰色かび病 そうか病									
かき	落葉病									
てんさい	根腐病	200~400 倍	ペーパーポット 1 冊当り 1L (3L/m ²)	移植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)			
	葉腐病	2000 倍	100~300 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布				
食用ぎく	白さび病			2 回以内	2 回以内					
きく	灰色かび病 うどんこ病			3 回以内	3 回以内		3 回以内			
ゆり	葉枯病 灰色かび病 うどんこ病									
チューリップ [°]	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病									
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病			2000 倍	100~300 L /10a		発病初期	3 回以内	散布	3 回以内
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップ、り んどうを除く)	灰色かび病 うどんこ病									

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス 室、ビニールハウ ス等の密閉で きる場所	うどんこ病	150g/10a	10 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	常温 煙霧	3 回以内
なす		すすかび病						