

クログワイに効果のある水稲用中期除草剤 MIC ザーベックス[®] SM粒剤

ザーベックスはOATアグリオ(株)の登録商標。

■幅広い適用雑草

クログワイ、オモダカ、シズイ、アゼナ、ホタルイなどの難防除雑草をはじめ、ほとんどすべての水田雑草に効果があります。

■体系処理で余裕の効果

体系処理剤なので、雑草の発生に合わせて処理できます。最近問題のアメリカアゼナ等に対する仕上げ剤としても有効です。

■クログワイ防除に…

クログワイに対し、有効な前処理剤との体系処理で、さらに有効な防除が可能です。



ホタルイ



アゼナ



シズイ

生育期のクログワイ

**イネ科からカヤツリグサ科まで
難防除雑草に高い効果!**



農林水産省「稲発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。



三井化学アグロ株式会社

イネ科から カヤツリグサ科まで 難防除雑草に高い効果!

ザーベックスはOATアグリオ(株)の登録商標。
アールタイプ、アルファプロ、クサトリーは、三井化学アグロ(株)の登録商標。
スラッシュャは住友化学(株)の登録商標。

クログワイに効果がある水稻用中期除草剤 MIC ザーベックス[®] SM粒剤

●シメトリン……1.5% ●ペンフレセート……2.0% ●MCPB……0.8%
●人畜毒性：普通物*

*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

2017年7月1日現在

■使用基準

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10a当り 使用量	本剤のみを使用する 場合の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ヒルムシロ エゾノサヤヌカグサ	移植後20日～ ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	砂壤土～埴土	3kg	1回	湛水散布	北海道
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ シズイ (東北)		壤土～埴土				東北 北陸
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ オモダカ クログワイ	移植後20日～ ノビエ2葉期 ただし、 移植後30日まで	砂壤土～埴土	近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯			

●総使用回数 シメトリン剤：2回以内 ペンフレセート剤：2回以内 MCPB剤：2回以内

■有効な体系処理例

クログワイ等が多い圃場の場合

移植後3日～10日

アールタイプ[®]
アルファプロ[®]
クサトリー[®]DX

クログワイ再生時期
(草丈5cmまでが最適期)

MIC ザーベックス[®] SM粒剤

ホタルイ等が多い圃場の場合

移植直後～7日

MIC スラッシュャ[®] 粒剤

移植後20日～25日

MIC ザーベックス[®] SM粒剤

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～5日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用を避けてください。
- 下記のような条件では薬害が発生する恐れがあるので使用を避けてください。
 - 1.砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - 2.軟弱な苗を移植した水田
 - 3.極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田
 - 4.稲の根が露出している水田
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布してください。
- 散布後の異常高温(急激な温度上昇、梅雨明け前後の高温)が予想される時は使用しないでください。
- 本剤はホルモン作用を持つ除草剤で、処理後低温が続く場合は稲苗の生育抑制などの薬害を生ずるおそれがあるので、処理時期の平均気温が15～16℃以下になるような場合には使用を避けてください。また、北海道、東北、北陸では稲5葉期以下では使用しないでください。

* 本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

* 本印刷物は2017年7月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例にあてはまるものではありません。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、使用時期に遅れないように散布してください。マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで(北海道)、エゾノサヤヌカグサは発生始期から2葉期まで、クログワイは発生始期まで、シズイは草丈5cmまで(東北)、オモダカは1葉期まで(東北、北陸)、2葉期まで(関東、東山、東海)及び発生始期まで(近畿、中国、四国)が使用適期ですので、時期を逸しないように散布してください。
- エゾノサヤヌカグサ、クログワイ、シズイ、オモダカは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないで、有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。
- 本剤は田面水からの揮散によりキュウリなどの生育を阻害する恐れがあるので、これらの生育期に隣接田で使用する場合に十分注意してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法に注意し、初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

ZSM1301G



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>