

3成分で安定した効果

水稲用 初・中期一発処理除草剤



農林水産省「稲発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。

クサトリー®BSX

ジャンボL

除草

一発

草取り

畦畔から投げ込むだけ!

畦畔からの侵入雑草にも!



コナギ



アゼナ類



イボクサ



ノビエ



ミスガヤツリ



ホタルイ



ウリカワ



オモダカ



クログワイ



三井化学アグロ株式会社

クサトリーは三井化学アグロ(株)の登録商標

クサトリー®BSX ジャンボL

有効成分：
 フェントラザミド ……10.0%
 ベンスルフロンメチル ……1.7%
 ベンゾビシクロン ……6.7%

人畜毒性：普通物※

※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

1. ノビエはもちろん、難防除雑草を含む広範囲の雑草に優れた効果があります。
2. SU抵抗性のアゼナ類、コナギ、ホタルイ等にも効果を発揮します。
3. 畦畔からの侵入雑草対策としても有効です。
4. 畦畔から投げ込むだけで散布できるうえ、周辺へ飛散することもほとんどありません。


■適用雑草および使用方法

(2019年11月6日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ	移植後1日～ ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g)	1回	水田に 小包装 (パック) のまま 投げ入れる
直播水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

※各有効成分を含む農薬の総使用回数：フェントラザミド…1回、ベンスルフロンメチル…2回以内、ベンゾビシクロン…3回以内

■上手な使い方 (移植水稲)



■使用上の注意事項

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリ、ウリカワは2葉期まで、オモダカ、クログワイは発生前～発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期が本剤の散布適期です。
- 苗の植付けが均一となるように代かきをていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 処理に当たっては、水の出入りを止めて水深5～6cmの湛水状態にし、散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布してください。
- 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので、使用をさしてください。

- 本剤は小包装(パック)のまま10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- 補植は必ず散布前に行ってください。
- 散布後に多量の雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさしてください。
- 藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるため使用をさしてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することのないように注意してください。
- 下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさしてください。
 - ・砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - ・軟弱な苗を移植した水田
 - ・極端な浅槽の水田及び浮き苗の多い水田
- 本剤はその殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- 散布田の水田水を他の作物に灌水しないでください。
- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、水管理を適正に行ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病虫害防除等関係機関の指導を受けることをお

勧めします。

■安全使用上の注意

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法では人畜に影響はありません。ただし、濡れた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■保管

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。水溶性フィルムは吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管してください。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除口誌を記載しましょう。

*本製品は水稲用除草剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2019年11月6日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

BSX1JL1F



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイアビルディング
 ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>