

作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カルビクリンを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 苗立枯病 (ヒシム菌)	<床土・堆肥> 2.2m/m <sup>2</sup>	2回以内 (床土1回以内、圃場1回以内)		3回以内 (床土1回以内、圃場2回以内)	
	ホモプシス根腐病 つる割病 ネコブセンチュウ	<圃場> 110m/100m <sup>2</sup>				
すいか	つる割病 ネコブセンチュウ		1回			
ピーマン とうがらし類	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	<床土・堆肥> 2.2m/m <sup>2</sup>	2回以内 (床土1回以内、圃場1回以内)			
	青枯病 疫病	<圃場> 110m/100m <sup>2</sup>				
トマト ミニトマト	萎凋病 褐色根腐病 ネコブセンチュウ		1回			
	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 苗立枯病 (ヒシム菌)	<床土・堆肥> 2.2m/m <sup>2</sup>				
いちご	萎黄病 ネグサレセンチュウ 疫病		1回	土壌くん蒸		
ねぎ	白絹病					
にら	紅色根腐病					
さやえんどう	根腐病 萎凋病	<圃場> 110m/100m <sup>2</sup>				
しょうが	根茎腐敗病					
ほうれんそう	萎凋病					
なす	半身萎凋病 青枯病					
	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	<床土・堆肥> 2.2m/m <sup>2</sup>				
わけぎ あさつき	白絹病	<圃場> 110m/100m <sup>2</sup>			2回以内 (床土1回以内、圃場1回以内)	
メロン	黒点根腐病 ネコブセンチュウ					
	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 苗立枯病 (ヒシム菌)	<床土・堆肥> 2.2m/m <sup>2</sup>	1回			
キャベツ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)					
サラダ菜 非結球レタス (サラダ菜を除く) レタス	ビッグベイン病	<圃場> 110m/100m <sup>2</sup>	1回	1回		

2016年4月6日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	カリブリンを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	立枯病	〈圃場〉 110m/100m <sup>2</sup>	1回	土壌くん蒸	1回
かんしょ	ネコブセンチュウ				
チューリップ	根腐病				3回以内 (床土1回以内、圃場2回以内)
カーネーション	萎凋細菌病				
トルコギキョウ	立枯病 根腐病				
りんどう	褐色根腐病				
きく	立枯病 半身萎凋病				

