

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクダジンを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病	1000～ 1500倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	6回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以内)
	黒点病	1000倍					
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病	1500倍		収穫14日前 まで	5回以内		5回以内 (塗布剤は2回以内、 液剤は1回以内)
すもも	灰星病	2000倍		収穫3日前 まで	3回以内		3回以内
うめ	黒星病 灰色かび病 すす斑病	2000倍		収穫30日前 まで			
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	灰星病	2000倍					
おうとう		1000～ 2000倍		収穫7日前 まで			
もも	灰星病 ホエブシ腐敗病	1000～ 2000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内 (休眠期は1回以内)	
初タリン	黒星病	1500～ 2000倍			2回以内	2回以内	
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～ 2000倍					
	灰色かび病	10倍	4L/10a	収穫3日前 まで	無人航空機 による散布		
		20倍	8L/10a				
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10倍	5L/10a				
		20倍	10L/10a				
かんきつ (みかんを除 く)	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～ 2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクダジンを含む農薬の総使用回数
くり	実炭疽病	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	菌核病	1000倍	100～300L/10a	収穫28日前まで	3回以内		3回以内
にんじん	黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 菌核病			収穫14日前まで	5回以内		無人航空機による散布
	斑点病	8倍	2L/10a	2回以内			
らっきょう	灰色かび病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで			
すいか	炭疽病 うどんこ病 菌核病 つる枯病			4回以内	4回以内		
メロン	うどんこ病 菌核病 つる枯病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
かぼちゃ	うどんこ病			収穫7日前まで	4回以内	4回以内	
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	7回以内	7回以内	
にがうり	うどんこ病	4000倍					
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
トマト	灰色かび病 葉かび病	2000～4000倍			3回以内	3回以内	
ミニトマト	うどんこ病 すすかび病	4000倍	2回以内	2回以内			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクダジンを含む農薬の総使用回数
いちご	炭疽病 うどんこ病 輪斑病	1000倍	100～ 300L/10a	育苗期 (定植前)	5回以内	散布	10回以内 (育苗期は5回以内、 本圃では5回以内)
	うどんこ病	2000～ 4000倍		収穫前日まで (生育期)			
	灰かび病 炭疽病 黒斑病	2000倍					
アスパラガス	褐斑病 斑点病	1000倍	1.6L/10a	収穫開始 7日前まで	5回以内	無人航空機 による散布	5回以内
	斑点病	8倍					
やまのいも	炭疽病 葉渋病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	5回以内 (種いもへの処理は 1回以内、 無人航空機散布は 3回以内)
	葉渋病	12倍	3L/10a			無人航空機 による散布	
	青かび病	200倍	-	植付前	1回	1～10分間 種いも浸漬	
やまのいも (むかご)	青かび病	200倍	-	植付前	1回	1～10分間 種いも浸漬	1回
だいず	腐敗粒 子実汚斑病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以 内)
	紫斑病	6倍	0.8L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	無人航空機 による散布	
		12倍	1.6L/10a				
茶	炭疽病 新梢枯死症 輪斑病	1500～ 2000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
アイリス	青かび病	100倍	-	植付前	1回	10分間 球根浸漬	8回以内
		200倍				30分間 球根浸漬	
チューリップ	褐色斑点病	1000倍	100～ 300L/10a	発生初期	8回以内	散布	