

サムコルフロアブル10 (第22469号) (1/2)

2020年2月26日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クワントレリア <sup>®</sup> ロール を含む農薬の 総使用回数
りんご	シクイムシ類 ハマキムシ類 ギンモンホガ ギンモンホケリガ ケムシ類 ヒメボクトウ	2500～ 5000倍	200～ 700L/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨモギエダシヤク オオタバコガ						
ぶどう	ハマキムシ類 モンキクロノメガ ケムシ類 クビアカスシバ	5000倍					
おうとう	コスカシバ	5000倍					
	ハマキムシ類 ケムシ類	2500～ 5000倍					
	オトウシヨウジヨウバエ	2500倍					
なし	ケムシ類 シクイムシ類	2500～ 5000倍					
	ハマキムシ類 ヒメボクトウ						
かき	ヒロヘリアオイラガ カキノハタムシガ ハマキムシ類 ケムシ類 ハスモンヨトウ フタモンダラメイガ	5000倍					
うめ	ノメトガリキリガ コスカシバ						
	ケムシ類	2500～ 5000倍					
	ハマキムシ類	2500倍					
すもも	シクイムシ類						
あんず	ケムシ類 ハマキムシ類	2500～ 5000倍					
		2500倍					
ふさすぐり	スグリコスカシバ						
もも	シクイムシ類 モモホケリガ						
ネクタリン	ハマキムシ類 コスカシバ	5000倍					
			収穫 前日まで	2回以内		2回以内	
			収穫 3日前まで				

サムコルフロアブル10 (第22469号) (2/2)

2020年2月26日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クワントレリア <sup>®</sup> ロール を含む農薬の 総使用回数
茶	チャノカクモハマキ チャハマキ ヨモギエダシヤク	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回	散布	1回
	チャノホガ	2000～ 4000倍					
	ハスモンヨトウ	4000倍					
さとうきび	イネヨトウ	5000倍	100～ 300L/10a	収穫30日 前まで	3回以内	4回以内 (粒剤は1回 以内、水和剤は 3回以内)	