

| 作物名                 | 適用場所 | 適用病害虫名           | 希釈倍数            | 使用液量   | 使用時期             | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |                 |
|---------------------|------|------------------|-----------------|--|------------------|---------|------|---|-----------------|
| 稲                   | —    | カメムシ類            | 2000 倍          | 60～150L<br>/10a  | 収穫 7 日<br>前まで    | 3 回以内   | 散布   | 4 回以内<br>(育苗箱への<br>処理及び側条<br>施用は合計 1<br>回以内、本田<br>での散布、空<br>中散布、無人<br>航空機散布は<br>合計 3 回<br>以内)                       |                 |
|                     |      | ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ | 3000 倍          |  |                  |         |      | 3 回以内   |                 |
|                     |      | アブラムシ類<br>カメムシ類  | 2000 倍          |  |                  |         |      | 3 回以内   |                 |
| 未成熟<br>とうもろこし       | —    | アブラムシ類<br>カメムシ類  | 2000 倍          | 100～300L<br>/10a   | 収穫前日<br>まで       | 2 回以内   | 散布   | 3 回以内<br><br>3 回以内<br>(育苗期の<br>株元散布及び<br>定植時の土壤混<br>和は合計<br>1 回以内、散布<br>及び定植後の<br>株元散布は<br>合計 2 回以内)                |                 |
| ムキゲヒレアブラムシ<br>カメムシ類 |      | 2000 倍           |                 |  |                  |         |      |   |                 |
| とうもろこし<br>(子実)      |      | アブラムシ類           | 3000 倍          |  |                  |         |      |   | 2000～<br>3000 倍 |
| ピーマン                | —    | アブラムシ類           | 3000 倍          | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壤<br>約 1.5～4.0L)<br>当り 0.5L | 鉢上時<br>又は<br>定植時 | 1 回     | 灌注   | 5 回以内<br>(培土混和及び<br>灌注は合計<br>1 回以内、育苗<br>期の株元散布は<br>1 回以内、定植<br>時の土壤混和は<br>1 回以内、散布<br>及び定植後の<br>株元散布は<br>合計 2 回以内) |                 |
|                     |      | コナジラミ類           | 2000～<br>3000 倍 |  |                  |         |      |   | 2000～<br>3000 倍 |
|                     |      | アザミウマ類<br>カメムシ類  | 2000 倍          |  |                  |         |      |   | 2000 倍          |
| トマト<br>ミニトマト        | —    | コナジラミ類           | 100 倍           | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壤<br>約 1.5～4.0L)<br>当り 0.5L | 鉢上時<br>又は<br>定植時 | 1 回     | 灌注   | 5 回以内<br>(培土混和及び<br>灌注は合計<br>1 回以内、育苗<br>期の株元散布は<br>1 回以内、定植<br>時の土壤混和は<br>1 回以内、散布<br>及び定植後の<br>株元散布は<br>合計 2 回以内) |                 |
|                     |      | コナジラミ類           | 2000～<br>3000 倍 |  |                  |         |      |   | 2000～<br>3000 倍 |
|                     |      | カメムシ類            | 2000 倍          |  |                  |         |      |   | 2000 倍          |
| なす                  | —    | コナジラミ類           | 2000～<br>3000 倍 | 100～300L<br>/10a   | 収穫前日<br>まで       | 2 回以内   | 散布   | 3 回以内<br>(育苗期の株<br>元散布及び定<br>植時の土壤混<br>和は合計 1 回<br>以内、散布及<br>び定植後の株<br>元散布は合計<br>2 回以内)                             |                 |
|                     |      | アブラムシ類           | 3000 倍          |  |                  |         |      |   | 3000 倍          |
|                     |      | アザミウマ類<br>カメムシ類  | 2000 倍          |  |                  |         |      |   | 2000 倍          |
| とうがらし類              | —    | アブラムシ類           | 3000 倍          | 100～300L<br>/10a   | 収穫前日<br>まで       | 2 回以内   | 散布   | 4 回以内<br>(育苗期の株元<br>散布及び定植<br>時の土壤混和は<br>合計 1 回以内、<br>定植後の株元<br>散布は 1 回<br>以内、散布は<br>2 回以内)                         |                 |
|                     |      | コナジラミ類           | 2000～<br>3000 倍 |  |                  |         |      |   | 2000～<br>3000 倍 |
|                     |      | アザミウマ類<br>ナスミハエ  | 2000 倍          |  |                  |         |      |   | 2000 倍          |

2020年1月29日現在

| 作物名                       | 適用場所   | 適用病害虫名                   | 希釈倍数       | 使用液量   | 使用時期     | 本剤の使用回数  | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |
|---------------------------|--------|--------------------------|------------|--|----------|----------|------|---|
| とうがらし(葉)                  |        | コナジラミ類                   | 2000～3000倍 | 100～300L/10a   | 収穫14日前まで | 2回以内     | 散布   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)                           |
|                           |        | アブラムシ類                   | 3000倍      |  | 収穫前日まで   |          |      |   |
| かぼちゃ                      |        | アザミウマ類                   | 2000倍      | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L |          | 定植前日～定植時 | 1回   | 灌注  |
|                           |        | コナジラミ類                   |            |  | 100倍     |          |      |   |
| きゅうり                      | —      | アブラムシ類<br>コナジラミ類         | 2000～3000倍 | 100～300L/10a   |          | 収穫前日まで   | 2回以内 | 散布  |
|                           |        | アザミウマ類<br>ウリハムシ<br>カメムシ類 | 2000倍      |  |          |          |      |   |
| すいか                       | —      | アブラムシ類                   | 2000～3000倍 | 100～300L/10a   | 収穫7日前まで  | 2回以内     | 散布   | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| メロン                       |        | コナジラミ類                   | 2000～3000倍 | 100～300L/10a   | 収穫3日前まで  | 2回以内     | 散布   | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)               |
|                           |        | アブラムシ類                   | 3000倍      |  |          |          |      |   |
| うり類<br>(漬物用、ただし、とうがらんを除く) |        | コナジラミ類<br>アザミウマ類         | 2000倍      | 100～300L/10a   | 収穫7日前まで  | 2回以内     | 散布   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)                           |
|                           |        | アブラムシ類                   |            |  |          |          |      |   |
| とうがん                      |        | コナジラミ類<br>アザミウマ類         | 2000倍      | 100～300L/10a   | 収穫前日まで   | 2回以内     | 散布   | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)             |
| にがうり                      | コナジラミ類 |                          |            |  |          |          |      |   |
| ズッキーニ                     |        | アブラムシ類                   | 2000倍      | 100～300L/10a   | 収穫前日まで   | 2回以内     | 散布   | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)             |
| まくわうり                     |        |                          | 3000倍      | 100～300L/10a   | 収穫3日前まで  | 2回以内     | 散布   | 2回以内  |

| 作物名  | 適用場所     | 適用病害虫名                             | 希釈倍数             | 使用液量   | 使用時期   | 本剤の使用回数 | 使用方法  | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |   |              |     |  |
|--|----------|------------------------------------|------------------|--|--|---------|---|---|---|--------------|-----|--|
| きゅうり(葉)  | —        | アブラムシ類<br>コナジラミ類                   | 3000 倍           | 100～300L<br>/10a   | 収穫 3 日<br>前まで  | 2 回以内   | 散布  | 2 回以内   |   |              |     |  |
| きゅうり(花)  |          |                                    |                  |  | 収穫<br>前日まで   |         |   |   |   |              |     |  |
| ブロッコリー   |          | アブラムシ類                             | 2000～<br>3000 倍  |  | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壌<br>約 1.5～4.0L)<br>当り 0.5L |         |   |   | 定植時   | 1 回          | 灌注  | 3 回以内<br>(定植時の土壌<br>混和及び灌注は<br>合計 1 回以内、<br>散布は 2 回<br>以内) |
|  |          | アブラムシ類<br>コナガ                      | 100 倍            |  |  |         |   |   |   |              |     |  |
| はくさい   |          | アブラムシ類                             | 2000～<br>3000 倍  | 100～300L<br>/10a   | 収穫 3 日<br>前まで  | 2 回以内   | 散布  | 3 回以内<br>(定植時の土壌<br>混和及び灌注は<br>合計 1 回以内、<br>散布は 2 回<br>以内)  |   |              |     |  |
|  |          | キスジノミハムシ                           | 2000 倍           |  |  |         |   |   |   |              |     |  |
| キャベツ   |          | アブラムシ類                             | 2000～<br>3000 倍  |  |  |         |   |   | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壌約<br>3L)<br>当り 0.5L | 定植前日～<br>定植時 | 1 回 | 灌注   |
|  |          | アブラムシ類<br>コナガ<br>アオムシ<br>ハイマダラノメイガ | 50～<br>100 倍     |  |  |         |   |   |   |              |     |  |
| レタス<br>非結球レタス                                    |          | アブラムシ類                             | 2000～<br>3000 倍  | 100～300L<br>/10a   | 収穫 3 日<br>前まで  | 2 回以内   | 散布  | 4 回以内<br>(は種前の培土<br>混和は 1 回<br>以内、育苗期の<br>株元散布、定植<br>時の土壌混和<br>及び育苗トレイへ<br>の灌注は合計<br>1 回以内、<br>散布は 2 回<br>以内) |   |              |     |  |
|  |          | ハスモンヨトウ                            | 50 倍             | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壌<br>約 1.5～4.0L)<br>当り 0.5L | 定植前日<br>～<br>定植時   | 1 回     | 灌注  |   |   |              |     |  |
| チンゲンサイ   | アブラムシ類   | 3000 倍                             | 100～300L<br>/10a | 収穫 3 日<br>前まで  | 2 回以内  | 散布      | 3 回以内<br>(は種時及び<br>定植時の土壌<br>混和は合計 1<br>回<br>以内、散布は<br>2 回以内) |   |   |              |     |  |
|  | キスジノミハムシ | 2000 倍                             |                  |  |  |         |   |   |   |              |     |  |
| 非結球あぶらな<br>科葉菜類<br>(チンゲンサイ<br>を除く)<br>なばな類<br>かぶ | アブラムシ類   | 3000 倍                             |                  |  |  |         |   |   |   |              |     | 3 回以内<br>(は種時の<br>土壌混和は<br>1 回以内、散布<br>は 2 回以内)            |
|  | キスジノミハムシ | 2000 倍                             |                  |  |  |         |   |   |   |              |     |  |

2020年1月29日現在

| 作物名    | 適用場所                                       | 適用病害虫名  | 希釈倍数                | 使用液量   | 使用時期                       | 本剤の使用回数                    | 使用方法  | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |              |
|--------|--|---|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------|
| だいこん   | —  | アブラムシ類  | 2000～3000倍          | 100～300L/10a   | 収穫7日前まで                    | 2回以内                       | 散布  | 5回以内<br>(は種時の播溝<br>土壌混和は<br>1回以内、は種時<br>の全面土壌混和<br>は1回以内、<br>粒剤の散布は<br>1回以内、水溶<br>剤及び液剤の<br>散布は合計<br>2回以内)                  |              |
|        |  | キスジノミハムシ  | 1000倍               |  |                            |                            |   |   |              |
| クレソン   |  | アブラムシ類  | 3000倍               |  | 収穫3日前まで                    | 3回以内                       |   |   |              |
| ねぎ     |  | アサミウマ類  | 2000倍               | セル成型育苗<br>トレイ1箱または<br>ペーパーポット1冊<br>(30×60cm・<br>使用土壌<br>約1.5～4.0L)<br>当り0.5L | 定植前日<br>～<br>定植時           | 1回                         | 灌注  | 4回以内<br>(は種時の土壌<br>混和、育苗トレ<br>イへの灌注及び<br>定植時の株<br>元散布は合計<br>1回以内、生<br>育期の株元灌<br>注は1回以<br>内、散布及び<br>定植後の株元<br>散布は合計<br>2回以内) |              |
|        |  | アサミウマ類<br>ハモグリハエ類<br>シロイチモンジヨトウ<br>タネハエ<br>ネギコガ | 50倍                 |  |                            |                            |   |   |              |
|        |  | クロハネキノコバエ類                                      | 1000倍               |  | 1L/m <sup>2</sup>          | 生育期<br>但し、<br>収穫14<br>日前まで | 株元<br>灌注  |   |              |
|        |  | アサミウマ類<br>ハモグリハエ類<br>トビイロヒヨウタンゾウムシ              | 400倍                |  | 0.4L/m <sup>2</sup>        |                            |   |   |              |
| にら     |  | ネギアサミウマ   |                     |  |                            | 株元<br>灌注                   | 3回以内<br>(生育期の株元<br>灌注は1回<br>以内、散布は<br>2回以内)                       |   |              |
|        |  | ネギアサミウマ<br>アブラムシ類                               | 2000倍               | 100～300L/10a   | 収穫<br>前日まで                 | 2回以内                       |   | 散布  |              |
|        |  | クロハネキノコバエ類                                      | 1000倍               | 1L/m <sup>2</sup>  | 生育期<br>但し、<br>収穫14<br>日前まで | 1回                         |   | 株元<br>灌注  |              |
| わけぎ    | アサミウマ類                                     | 2000倍   | 100～300L/10a        | 収穫3日前<br>まで  | 2回以内                       | 散布                         | 4回以内<br>(定植後の株元<br>散布は1回以<br>内、生育期の<br>株元灌注は<br>1回以内、散布<br>は2回以内) |   |              |
|        | アサミウマ類<br>ハモグリハエ類                          | 400倍  | 0.4L/m <sup>2</sup> | 生育期<br>但し、<br>収穫14<br>日前まで   | 1回                         | 株元<br>灌注                   |   |   |              |
| アスパラガス | コナジラミ類<br>アサミウマ類<br>カメムシ類<br>ジユウシホシクビナガハムシ | 2000倍   | 100～800L/10a        | 100～300L/10a   | 収穫前日<br>まで                 | 3回以内                       | 散布  | 3回以内  |              |
| らっきょう  | アサミウマ類                                     |   |                     |  |                            |                            |   |   |              |
| さとうきび  | アブラムシ類<br>カンジャコハネナガカメムシ<br>サトウキビチビアサミウマ    |   |                     |  | 100～300L/10a               |                            |   |   | 収穫45<br>日前まで |

2020 年 1 月 29 日現在

| 作物名  | 適用場所                         | 適用病害虫名                                  | 希釈倍数   | 使用液量                | 使用時期                        | 本剤の使用回数       | 使用方法     | ジノテフランを含む農薬の総使用回数  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
|--|------------------------------|---|--------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------|--|-------|----|---|---------------|-------|----|--------|---------------|---------------|-------|----|-------|---------------|---------------|-------|----|-------|---------------|---------------|-------|----|-------|----|-------|--|
| にんじん   | —                            | アブラムシ類                                  | 2000 倍 | 100~300L /10a       | 収穫 7 日前まで                   | 2 回以内         | 散布       | 4 回以内<br>(は種時の<br>土壌混和は<br>1 回以内、<br>生育期の<br>株元灌注は<br>1 回以内、散布<br>は 2 回以内) |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
|  |                              | トビイロヒョウタンゾウムシ<br>クロハネキノコバエ類             | 400 倍  | 0.4L/m <sup>2</sup> | 生育期<br>但し、収穫<br>21 日前ま<br>で | 1 回           | 株元<br>灌注 |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| セルリー   |                              | アブラムシ類                                  | 2000 倍 | 100~300L /10a       | 収穫 14 日前まで                  | 2 回以内         | 散布       | 3 回以内<br>(定植時の土壌<br>混和は1回<br>以内、散布は<br>2 回以内)                              |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| ほうれんそう   |                              | アブラムシ類<br>ウリハムシトキ                       | 3000 倍 |                     | 収穫 3 日<br>前まで               |               |          | 3 回以内<br>(は種時の土壌<br>混和は1回<br>以内、散布は<br>2 回以内)                              |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| しゅんぎく  |                              | アブラムシ類                                  |        |                     | 収穫前日<br>まで                  |               |          | 3 回以内<br>(は種時及び<br>定植時の土壌<br>混和は合計<br>1 回以内、散布<br>は 2 回以内)                 |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| だいず  |                              | カメムシ類<br>ダイズサヤタマハエ                      | 2000 倍 |                     | 100~300L /10a               |               |          | 収穫 7 日<br>前まで  | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内<br>(は種時の土壌<br>混和は1回<br>以内、散布は<br>2 回以内) |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
|  |                              | フタスジヒメハムシ                               | 3000 倍 |                     |                             |               |          |  |       |    | 3 回以内   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| あずき  |                              | アブラムシ類                                  | 2000 倍 |                     |                             |               |          |  |       |    | 100~300L /10a                                 | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内  |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげを除く) |                              | アブラムシ類<br>ハモグリハエ類                       |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    | 2 回以内  | 2 回以内         |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| えだまめ   |                              | カメムシ類<br>ダイズサヤタマハエ<br>アブラムシ類<br>ハモグリハエ類 |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    | 3000 倍 | 100~300L /10a | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内 | 散布 | 2 回以内 |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
|  |                              | フタスジヒメハムシ                               |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       | 3000 倍        |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| 未成熟ささげ   |                              | アブラムシ類<br>ハモグリハエ類                       |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    | 2000 倍 |               |               |       |    |       | 100~300L /10a | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内 | 散布 | 2 回以内 |               |               |       |    |       |    |       |  |
| さやいんげん   | アブラムシ類<br>ハモグリハエ類<br>コナジラミ類  | 2000 倍                                  |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       | 100~300L /10a | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内 | 散布 | 2 回以内 |    |       |  |
|  | アブラムシ類<br>ハモグリハエ類<br>ウラナミシジミ |   |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| さやえんどう<br>実えんどう                                | アブラムシ類<br>ハモグリハエ類<br>ウラナミシジミ | 2000 倍                                  |        | 100~300L /10a       |                             | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内    |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       | 散布 | 2 回以内 |  |
| しょうが   | クロハネキノコバエ類                   |   |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |
| オクラ  | アブラムシ類                       |   |        |                     |                             |               |          |  |       |    |   |               |       |    |        |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |               |               |       |    |       |    |       |  |

2020 年 1 月 29 日現在

| 作物名          | 適用場所                     | 適用病害虫名  | 希釈倍数                           | 使用液量             | 使用時期             | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |       |
|--------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|---------|------|-------------------|-------|
| ばれいしょ        | —                        | ワタアブラムシ   | 2000 倍                         | 100～300L<br>/10a | 収穫 7 日前まで        | 2 回以内   | 散布   | 2 回以内             |       |
| かんしょ         |                          | コナジラミ類<br>アブラムシ類  |                                |                  | 収穫 3 日前まで        | 1 回     |      | 1 回               |       |
| せり           | 水田                       | アブラムシ類  |                                |                  | 収穫 7 日前まで        | 3 回以内   |      | 3 回以内             | 3 回以内 |
| せり<br>(水耕栽培) | ガラス室等の施設                 |   |                                |                  | 収穫 3 日前まで        |         |      |                   |       |
| すいぜんじな       | —                        | アブラムシ類  |                                |                  | 収穫前日まで           | 2 回以内   |      | 2 回以内             | 2 回以内 |
| モロヘイヤ        |                          |   |                                |                  | アザミウマ類           |         |      |                   |       |
| なんてん(葉)      |                          | アブラムシ類  |                                |                  |                  |         |      |                   |       |
| ふき           |                          | コナジラミ類  |                                |                  | 収穫 7 日前まで        |         |      |                   |       |
| りんご          | —                        | アブラムシ類<br>キンモンホソガ<br>シンクイムシ類<br>ギンモンハモグリガ<br>コナカイガラムシ類<br>カメムシ類 |                                |                  | 200～700L<br>/10a | 収穫前日まで  |      | 3 回以内             | 3 回以内 |
| もも<br>ネクタリン  |                          | アブラムシ類<br>モモハモグリガ<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類<br>モモチョッキリゾウムシ            |                                |                  |                  |         |      |                   |       |
| おうとう         |                          | オウトウショウジョウバエ<br>カメムシ類   | 2 回以内                          | 2 回以内            |                  |         |      |                   |       |
| なし           |                          | アブラムシ類<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類<br>ケムシ類<br>コナカイガラムシ類<br>チュウゴクナシキジラミ  | 3 回以内                          | 3 回以内            |                  |         |      |                   |       |
| かき           |                          | カメムシ類<br>コナカイガラムシ類<br>カキノハタムシガ<br>アザミウマ類                        | 4 回以内<br>(塗布は1回以内、<br>散布は3回以内) |                  |                  |         |      |                   |       |
| ぶどう          | フタテンヒメヨコバイ               | 3000 倍  | 3 回以内                          | 3 回以内            |                  |         |      |                   |       |
|              | カメムシ類<br>ブドウトラカミキリ       | 2000 倍  |                                |                  |                  |         |      |                   |       |
|              | チャノキイロアザミウマ<br>コナカイガラムシ類 | 1000～<br>2000 倍   |                                |                  |                  |         |      |                   |       |



2020 年 1 月 29 日現在

| 作物名  | 適用場所  | 適用病害虫名            | 希釈倍数   | 使用液量             | 使用時期            | 本剤の使用回数                          | 使用方法          | ジノテフランを含む農薬の総使用回数                               |          |   |
|--|---|-------------------|--------|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---|----------|---|
| しそ   | —   | アブラムシ類<br>ウリハムシトキ | 3000 倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫 3 日<br>前まで   | 2 回以内                            | 散布            | 3 回以内<br>(定植時の土壌<br>混和は 1 回<br>以内、散布は<br>2 回以内) |          |   |
| バジル<br>しよくようほおずき<br>食用ミニバラ<br>食用カーネーション<br>食用パンジー<br>食用金魚草<br>食用レニア<br>食用なでしこ<br>食用プリムラ<br>食用エキザカム<br>食用せんいちこう |   | アブラムシ類<br>コナジラミ類  |        |                  |                 |                                  |               | 2 回以内   |          |   |
| 食用コスモス   |   | アブラムシ類<br>コナジラミ類  |        |                  |                 |                                  |               | 2 回以内   |          |   |
| 食用ぎく   |   | アブラムシ類<br>コナジラミ類  |        |                  | 2000～<br>3000 倍 | 1L/m <sup>2</sup>                | 収穫 7 日<br>前まで | 5 回以内   | 灌注       | 3 回以内<br>(定植時の土<br>壌混和は 1 回<br>以内、散布は<br>2 回以内) |
| 花き類・<br>観葉植物<br>(きくを除く)  |   | アブラムシ類<br>コナジラミ類  |        |                  | 2000～<br>3000 倍 |                                  |               |   |          | 散布  |
| きく   |   | アブラムシ類<br>コナジラミ類  |        |                  | 2000～<br>3000 倍 | 100～<br>300L/10a                 | 発生初期          | 5 回以内   | 灌注       | 5 回以内<br>(株元灌注は<br>2 回以内)                       |
|  |   | カメシ類              |        |                  | 2000 倍          | 100～<br>700L/10a                 |               |   |          |   |
| 樹木類<br>(つつじ類、<br>つばき類を<br>除く)  |   | アブラムシ類            |        |                  | 2000 倍          | 100～<br>700L/10a                 | 発生初期          | 5 回以内   | 散布       | 5 回以内   |
| つつじ類   |   | ツツジゲンバイ<br>ケムシ類   |        |                  | 2000 倍          | 100～300L<br>/10a                 |               |   |          |   |
| つばき類   |   | ケムシ類              |        |                  | 2000 倍          | 100～<br>700L/10a                 | 発生初期          | 2 回以内   | 株元<br>灌注 | 5 回以内<br>(株元灌注は<br>2 回以内)                       |
|  |   | チャドクガ             |        |                  | 100 倍           | 0.5～2L/樹<br>(但し、220L<br>/10a まで) |               |   |          |   |
| いね科牧草  |   | アブラムシ類            |        |                  | 2000 倍          | 100～300L<br>/10a                 | 収穫 7 日<br>前まで | 3 回以内   | 散布       | 3 回以内   |
| 水田作物、<br>畑作物<br>(休耕田)  | ヨシ、オギ、<br>ススキ、セイタカ<br>アワダチソウ等<br>の多年生<br>雑草が優<br>占している<br>休耕田 | カメシ類              | 2000 倍 | 60～150L<br>/10a  | —               | 3 回以内                            | 散布            | 3 回以内   |          |   |



| 作物名 | 適用病害虫名    | 使用量          | 使用時期                       | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ジノテフランを含む農薬の総使用回数                  |
|-----|-----------|--------------|----------------------------|---------|--|------------------------------------|
| かき  | コナカイガラムシ類 | 20～40g<br>/樹 | 発芽前<br>～<br>発芽期            | 1 回     | 本剤 1g 当り水 1mL の割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。 | 4 回以内<br>(塗布は 1 回以内、<br>散布は 3 回以内) |
| ぶどう |           |              | 幼果期まで<br>但し、収穫 30 日<br>前まで |         |  | 3 回以内<br>(塗布は 1 回以内)               |
|     | クビアカスカシバ  | 40g/樹        |                            |         |  |                                    |