

タチガレエースM液剤 (第22774号)

2019年10月9日現在

作物名	適用病害虫名 使用目的	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ヒドキシイサ ゾールを含む 農薬の総使 用回数	マテキル及び マテキルMを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (ヒシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促進	500～ 1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り 500mL	は種時 又は 発芽後	1回	土壌 灌注	3回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 移植前の土 壌灌注は2 回以内)	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 育苗箱への 灌注は 1回以内、 本田では 2回以内)
		1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り1L	は種時				
稲(湛水 直播)	苗腐病 (ヒシウム菌)	2.5～ 5倍	乾燥種籾 1kg当り 30mL	は種前		鉄コーテ ィング種 子に吹き 付け処理	1回	3回以内 (種もみへ の処理は1 回以内、本 田では2回 以内)