

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数	
稲	-	コブノメイガ	1000 倍	60～ 150L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～ 2000 倍						
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍						
きび	-	アカスジカスミカメ	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内		
あわ		アワヨトウ			収穫 前日まで				
ブロッコリー		アオムシ	1000～ 2000 倍		収穫 3 日 前まで				
キャベツ		アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			収穫 7 日 前まで				
はくさい		シロイチモジヨトウ			収穫 21 日前まで			2 回以内	2 回以内
だいこん		アブラムシ類			収穫 14 日前まで			3 回以内	3 回以内
ねぎ		アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	収穫 3 日 前まで						
レタス		アブラムシ類	1000 倍		3 回以内	4 回以内	4 回以内		
すいか		アブラムシ類 コナジラミ類							
メロン		アブラムシ類 コナジラミ類	1000～ 2000 倍		3 回以内	3 回以内	3 回以内		
なす		コナジラミ類							
ピーマン		アブラムシ類	1000 倍		3 回以内	3 回以内	3 回以内		
オクラ		アブラムシ類 カメムシ類							
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類							
にがうり	アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類	1000 倍	3 回以内	収穫前日 まで	3 回以内				
かぼちゃ	ウリハムシ								
トマト	コナジラミ類								
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ		2 回以内	2 回以内	2 回以内				

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数		
さやいんげん	—	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内		
えだまめ		マメシクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ			収穫 14 日 前まで					
		ハスモンヨトウ			1000～ 2000 倍				収穫前 日まで	
未成熟 ささげ		アブラムシ類	1000 倍		収穫前 日まで	1 回			1 回	
うど					根株 養成期 但し、 収穫 45 日 前まで					
					アザミウマ類					収穫 14 日前まで
モロヘイヤ		コアオハナムグリ ケシキスイ類	1000～ 2000 倍		200～ 700L/ 10a	収穫 14 日前まで			3 回以内	3 回以内
かんきつ		ミカンハモグリガ								
		マンゴー								
小麦		ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000 倍		60～ 150L/ 10a	収穫 14 日前まで			2 回以内	2 回以内
とうもろこし		アワノメイガ アワヨトウ	1000 倍		100～ 300L/ 10a	収穫 7 日 前まで			4 回以内	4 回以内
ばれいしょ		アブラムシ類								
かんしょ		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ								
		やまのいも やまのいも (むかご)				アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ			収穫 14 日前まで	3 回以内
さといも		ハスモンヨトウ				1000 倍			100～ 300L/ 10a	収穫 7 日 前まで
さといも (葉柄)										

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数						
豆類 (種実、 ただし、 だいず、 あずきを 除く)	—	マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内						
だいず		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ												
あずき		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類												
しょうが 葉しょうが		ハスモンヨトウ							収穫 7 日 前まで	3 回以内	3 回以内			
ふき		コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ							収穫 14 日 前まで					
みつば		アブラムシ類							収穫 21 日前まで 但し、 伏せ込 み栽培 は伏せ 込み前ま で			2 回以内	2 回以内	
食用ぎく										2000 倍		収穫 3 日 前まで		

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数	
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類	1000 倍	100～ 150L /10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
せり	水田	オキナワイナゴモドキ							
みずいも		アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内	
あしたば	ヨトウムシ	1000～ 2000 倍							
てんさい	ホウキギツツミノガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	2 回以内			
ほうきぎ	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	200～ 400L/ 10a	摘採 21 日 前まで					
茶	タバコガ ヨトウムシ		1000～ 2000 倍	25～ 180L/ 10a	—				
たばこ	アブラムシ類	1000～ 2000 倍		180L/ 10a	—				
樹木類 (つつじ類、 ポインセチ ア、ソテツを 除く)	—	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～ 700L/ 10a	幼虫 発生期	6 回以内		6 回以内	
		オビカレハ	2000 倍		—				
		ツツジゲンバイ	2000 倍		—				
つつじ類		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍		幼虫 発生期				
		オビカレハ	2000 倍		—				
		コナジラミ類	1000 倍		—				
ポインセチア		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍		幼虫 発生期				
		オビカレハ	2000 倍						
		クロマダラソテツジミ	2000～ 4000 倍						
ソテツ		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍		100～ 300L/ 10a		—		
		オビカレハ	2000 倍						
宿根かすみ そう		シロイチモジヨトウ	1000 倍						
	ヨトウムシ	2000 倍							
りんどう	ヒラズハナアザミウマ								
きく カーネーション	アブラムシ類	1000 倍	発生 初期						
ゆり	ハスモンヨトウ		—						
トルコギキョウ	キアゲハ	1000 倍	幼虫 発生期						
採種用とうき	ウリハムシモドキ		1000 倍	収穫 14 日 前まで		3 回以内		3 回以内	
せんきゅう									

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、 ススキ、セタ カアワダチソ ウ等の多 年生雑草 が優占し ている休 耕田	カメムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	散布	3 回以内
稲	—	ウンカ類	300～ 600 倍	25L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300 倍					
		カメムシ類	600 倍					