

| 作物名 | 適用場所 | 適用病虫害名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|------------|------------------|--|---------------|------------|---------|-------|-----------------------|
| 稲 | — | イネツトムシ | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内 |
| | | カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ | 3~ 4kg/10a | | | | |
| | | イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ | 3kg/10a | | | | |
| 小麦 | — | ヒメビウンカ アブラムシ類 | 4kg/10a | 収穫 14 日前まで | 2 回以内 | 2 回以内 | |
| なす | テントウムシダマシ類 | 収穫前日まで | | 3 回以内 | 3 回以内 | | |
| トマト | コナジラミ類 | | | 2 回以内 | 2 回以内 | | |
| オクラ | — | アブラムシ類 | 4kg/10a | 収穫 3 日前まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| すいか | ハスモンヨトウ ウリハムシ | | | | | | |
| きゅうり | — | ウリハムシ | 3~ 4kg/10a | 収穫前日まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| はくさい | — | アオムシ | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | | | |
| | — | コナガ | | | | | |
| だいこん | — | ダイコンサルハムシ | 4kg/10a | 収穫 21 日前まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| | — | アオムシ | 3~ 4kg/10a | | | | |
| 豆類 (種実) | — | ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ | 4kg/10a | 収穫 14 日前まで | 2 回以内 | 2 回以内 | |
| えだまめ | — | ハスモンヨトウ | 3~ 4kg/10a | | | | |
| | — | マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| やまのいも | シロイチモジヨトウ | | | | | | |
| さといも | — | ハスモンヨトウ | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | 4 回以内 | 4 回以内 | |
| かんしょ | — | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | | | | | |
| ばれいしょ | — | テントウムシダマシ類 | 4kg/10a | 収穫 7 日前まで | 4 回以内 | 4 回以内 | |
| どうもろこし | — | アワノメイガ | | | | | |

2020 年 10 月 14 日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------|------|-----------------------|
| キャベツ | — | ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ | 3～ 4kg/10a | 収穫 3 日 前まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内 |
| れんこん | | マメコガネ | 4kg/10a | 収穫 14 日前まで | | | |
| 水田作物、 畑作物(休 耕田) | ヨシ、オ キ、スス キ、セイタカ アワダチソウ 等の多 年生雑 草が優 占してい る休耕田 | カメムシ類 | 3～ 4kg/10a | — | | | |