

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	カルビクリンを 含む農薬の 総使用回数	
りんご	紋羽病	1 穴当り 6～ 12mL	1 回	土壌 くん蒸	1 回	
あぶらな科野菜 (キャベツ、こまつな を除く)	萎黄病、センチュウ類、ハカネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL				2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉
こまつな					2 回以内 〈床土 1 回 以内〉	
だいこん					亀裂褐変症	1 回
はくさい	黄化病、軟腐病、根くびれ病					
キャベツ	萎黄病、センチュウ類、ハカネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉			
レタス 非結球レタス (サラダ菜を除く)	ビクバイン病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL	1 回		土壌 くん蒸	1 回
	根腐病、センチュウ類、ハカネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL				
サラダ菜	ビクバイン病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉			2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉
	根腐病、センチュウ類、ハカネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草					
ほうれんそう	萎凋病、立枯病、苗立枯病、 ホレンソウケナガコナギニ、センチュウ類 ハカネムシ類、ネリムシ類、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	1 回	2 回以内 〈床土 1 回 以内〉		
うり科野菜 (すいか、きゅうり、 メロン、にがうり、う り類(漬物用)を除く)	つる割病、白絹病、センチュウ類 ハカネムシ類、ネリムシ類、 一年生雑草	1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL				1 回
漬物用メロン			2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉			

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	カビ [®] クリンを 含む農薬の 総使用回数			
にがうり	疫病、つる割病、白絹病、苗立枯病、 センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	1 回	土壌 くん蒸	2 回以内 〈床土 1 回以内〉			
うり類 (漬物 用、ただし、漬 物用メロンを 除く)					3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉			
きゅうり					2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉			
メロン	2 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 1 回以内〉							
かぼちゃ (かぼちゃ台を含 む)	フザリウム立枯病	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL	1 回		土壌 くん蒸	1 回		
	フザリウム立枯病 一年生雑草	〈圃場〉 1 穴当り 3～4mL						
すいか	つる割病、白絹病、センチュウ類 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉			土壌 くん蒸	3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉	
	ホモ [®] シ根腐病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL						
ピーマン とうがらし類	萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉				土壌 くん蒸	3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉
トマト ミニトマト	青枯病、萎凋病、半身萎凋病 センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類 一年生雑草							
なす	青枯病、半身萎凋病 センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類 一年生雑草							
いちご	萎黄病、炭疽病、センチュウ類、 ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	1 穴当り 2～3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉	土壌 くん蒸				3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉
アスパラガス	立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、 ネキリムシ類、一年生雑草	1 回	2 回以内 〈床土 1 回以内〉					

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	カビ [®] クリンを 含む農薬の 総使用回数
せり科葉菜類 (セルリーを除く)	立枯病(パセリ)、センチュウ類、 ハカ [®] ネシ類、ネリムシ類、 一年生雑草	〈圃場〉 1 穴当り 2~3mL	1 回	土壌 くん蒸	1 回
セルリー	萎黄病、センチュウ類、ハカ [®] ネシ類、 ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3~6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2~3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉		3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉
しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草		2 回以内 〈床土 1 回以 内〉		
うど	萎凋病、一年生雑草		1 回		
にんじん	センチュウ類、ハカ [®] ネシ類、ネリムシ類 一年生雑草		2 回以内 〈床土 1 回以内〉		
ごぼう	黒あざ病、センチュウ類、ハカ [®] ネシ類 ネリムシ類、一年生雑草		1 回		
かんしょ	立枯病、つる割病、紋羽病、 センチュウ類、ハカ [®] ネシ類、ネリムシ類、 一年生雑草		2 回以内 〈床土 1 回以内〉		
さといも	疫病、センチュウ類、ハカ [®] ネシ類 ネリムシ類、一年生雑草		1 回		1 回
やまのいも	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類 ハカ [®] ネシ類、ネリムシ類、 一年生雑草				
ばれいしょ	そうか病		〈圃場〉 1 穴当り 3mL		1 回
	青枯病、センチュウ類、ハカ [®] ネシ類、 ネリムシ類、一年生雑草		〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3~6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2~3mL		

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	知此 [®] クリンを 含む農薬の 総使用回数			
ねぎ	白絹病 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉	土壌 くん蒸	3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉			
あさつき わけぎ					2 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 1 回以内〉			
たまねぎ	苗立枯病、一年生雑草	〈圃場〉 1 穴当り 3mL	1 回		1 回			
にんにく	根腐病、一年生雑草							
薬用ニンジン	根腐病、一年生雑草							
こんにゃく	乾腐病、白絹病、根腐病、 センチュウ類、ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、 一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL				1 回	1 回	
豆類(種実 ただし、いんげんま めを除く)	立枯病、白絹病、センチュウ類、 ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、 一年生雑草							
豆類(未成熟、ただ し、さやいんげん、 未成熟そらまめ、さ やえんどう、実えん どうを除く)								
さやえんどう 実えんどう いんげんまめ								2 回以内 〈床土 1 回以 内〉
さやいんげん								3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉
未成熟そらまめ				2 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 1 回以内〉				

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	カビ [®] クリンを 含む農薬の 総使用回数					
てんさい	黒根病、苗立枯病、センチュウ類 ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	1 回	土壌 くん蒸	1 回					
あま 麦類	立枯病、センチュウ類、ハカ [®] ネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草									
とうもろこし	白絹病、センチュウ類、ハカ [®] ネムシ類、 ネリムシ類、一年生雑草									
陸稲	センチュウ類、ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類 一年生雑草									
くきちしゃ	ビク [®] グ [®] ベ [®] イン病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL			1 回	土壌 くん蒸	2 回以内 〈床土 1 回 以内〉			
	根腐病、センチュウ類、ハカ [®] ネムシ類 ネリムシ類、一年生雑草	〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL								
葉しょうが	根茎腐敗病、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL						1 回	土壌 くん蒸	1 回
ふき ふき (ふきのとう)	半身萎凋病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL								
やまのいも (むかご)	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類 ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL								
らっきょう	白絹病	〈圃場〉 1 穴当り 3mL								
みつば	立枯病	〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL								
花き類・観葉植物	青枯病、半身萎凋病、萎凋病(フザ [®] リウム菌)、 萎黄病(フザ [®] リウム菌)、株枯病(フザ [®] リウム菌)、 乾腐病(フザ [®] リウム菌)、球根腐敗病(フザ [®] リウム菌)、 立枯病(フザ [®] リウム菌)、葉枯病(フザ [®] リウム菌)、 腐敗病(フザ [®] リウム菌)、センチュウ類、 ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL	2 回以内 〈床土 1 回 以内、圃場 1 回以内〉	3 回以内 〈床土 1 回以 内、圃場 2 回 以内〉						
きく	白絹病、立枯病									
カーネーション	立枯病									
りんどう	褐色根腐病									
ストック	苗立枯病									
デルフィニウム	立枯病									
スターチス ゆり	萎凋細菌病									
ほおずき	軟腐病									
トルコギキョウ	株腐病、苗立枯病									
いちじく(苗木)	白絹病、センチュウ類				〈圃場〉 1 穴当り 3mL	1 回	土壌 くん蒸	1 回		
桑	紋羽病	1 穴当り 6～ 12mL								
たばこ	白絹病、立枯病、センチュウ類、 ハカ [®] ネムシ類、ネリムシ類、一年生雑草	〈床土・堆肥〉 1 穴当り 3～6mL 〈圃場〉 1 穴当り 2～3mL								