

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
おうとう	灰星病 幼果菌核病 炭疽病 褐色せん孔病	1500 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病	1500～ 3000 倍					
	褐色斑点病	2000 倍					
ぶどう	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 晩腐病 黒とう病 さび病	1500 倍		収穫 7 日 前まで			
小粒核果類	灰星病 すす点病(すもも)			収穫前日 まで			
	黒星病	1500～ 2000 倍					
もも	黒星病 灰星病 果実赤点病	1500～ 2000 倍					
	うどんこ病	2000 倍					
ネクタリン	黒星病 灰星病	1500～ 2000 倍					
りんご	黒点病 斑点落葉病						
	黒星病 赤星病 モニリア病 すす点病 すす斑病 うどんこ病	1500～ 3000 倍					
	褐斑病 灰色かび病	2000 倍					
かんきつ	黒点病 灰色かび病 そうか病	1500～ 2000 倍					
かき	うどんこ病 灰色かび病 落葉病 炭疽病						
	すす点病	2000 倍					