

モンガリット粒剤（第20979号）（1/2）

2020年8月26日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シメコゾールを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 疑似紋枯症 （褐色紋枯病菌） 疑似紋枯症 （赤色菌核病菌） 疑似紋枯症 （灰色菌核病菌） 疑似紋枯症 （褐色菌核病菌） 稲こうじ病 墨黒穂病	3～4 kg/10a	収穫45日前 まで	2回以内	湛水散布	2回以内 （移植時ま での処理は 1回以内）
	穂枯れ （ごま葉枯病菌） 穂枯れ （すじ葉枯病菌）	4 kg/10a				
こんにゃく	白絹病	4～6 kg/10a	培土時 但し、収穫120 日前まで	3回以内	株元散布 （散布後 土寄せ）	3回以内
キャベツ	株腐病	6 kg/10a	定植前	1回	全面土壌 混和	1回
ごぼう	黒あざ病	9～18 kg/10a	は種時		播溝土壌 混和	
非結球レタス	すそ枯病	9～12kg /10a	定植前		全面土壌 混和	
レタス	ビッグペイン病	12kg/10a				
にんにく	黒腐菌核病	18kg/10a	植付前	2回以内	株元散布	6回以内 （植付前は 1回以内、 植付後の 株元散布は 2回以内、 散布は 3回以内）
	白絹病	6 kg/10a	土寄せ時 但し、収穫75 日 前まで （茎葉展開期）			

2020年8月26日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シメコゾールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病	6 kg/10a	生育期 但し、収穫14 日前まで	3回以内	株元散布	3回以内 (は種時は 1回以内)
	小菌核腐敗病	4～6 kg/10a	土寄せ時 但し、収穫14 日 前まで			
	白絹病					
	黒穂病		は種時	1回	土壌表面 散布	
にら	白絹病	6 kg/10a	定植前	1回	作条土壌 混和	1回
ほうれんそう	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	4～6 kg/10a	は種時		播溝土壌 混和	
未成熟 とうもろこし	紋枯病	6 kg/10a	収穫7日前 まで	2回以内	株元散布	2回以内