

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
稲	—	カメシ類	2000 倍	60～150L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空 中散布、無人 航空機散布は 合計 3 回 以内)	
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000 倍					3 回以内	
		アブラムシ類 カメシ類	2000 倍					3 回以内	
未成熟 とうもろこし	—	アブラムシ類 カメシ類	2000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	3 回以内 3 回以内 (育苗期の 株元散布及び 定植時の土壤混 和は合計 1 回以内、散布 及び定植後の 株元散布は 合計 2 回以内)	
ムキクビレアブラムシ カメシ類		2000～ 3000 倍							
とうもろこし (子実)		アブラムシ類	2000 倍						2000 倍
ピーマン	—	アブラムシ類	3000 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壤 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	灌注	5 回以内 (培土混和及び 灌注は合計 1 回以内、育苗 期の株元散布は 1 回以内、定植 時の土壤混和は 1 回以内、散布 及び定植後の 株元散布は 合計 2 回以内)	
		コナジラミ類	2000～ 3000 倍						2000～ 3000 倍
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍						
トマト ミニトマト	—	コナジラミ類	100 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壤 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	灌注	5 回以内 (培土混和及び 灌注は合計 1 回以内、育苗 期の株元散布は 1 回以内、定植 時の土壤混和は 1 回以内、散布 及び定植後の 株元散布は 合計 2 回以内)	
コナジラミ類		2000～ 3000 倍	2000～ 3000 倍						
カメシ類		2000 倍							
なす	—	コナジラミ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	3 回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壤混 和は合計 1 回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2 回以内)	
		アブラムシ類	3000 倍						
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍						
とうがらし類	—	アブラムシ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元 散布及び定植 時の土壤混和は 合計 1 回以内、 定植後の株元 散布は 1 回 以内、散布は 2 回以内)	
		コナジラミ類	2000～ 3000 倍						
		アザミウマ類 ナスミハエ	2000 倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
とうがらし(葉)		コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		アブラムシ類	3000倍					
		アザミウマ類	2000倍					
かぼちゃ		アブラムシ類	2000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	収穫前日まで	1回	灌注	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
			100倍		定植前日～定植時			
きゅうり		アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍		収穫前日まで			4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
		アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類	2000倍					
すいか	—	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで			4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
メロン		コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
		アブラムシ類	3000倍					
		アザミウマ類	2000倍					
うり類 (漬物用)		コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍		収穫7日前まで			3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		アブラムシ類	2000～3000倍					
にがうり		コナジラミ類						
ズッキーニ		アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで			4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
まくわうり			3000倍		収穫3日前まで			2回以内

2019年8月28日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
きゅうり(葉)	—	アブラムシ類 コナジラミ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
きゅうり(花)					収穫 前日まで			
ブロッコリー		アブラムシ類	2000～ 3000 倍		セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L			
		アブラムシ類 コナガ	100 倍					
はくさい	アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌 混和及び灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)	
	キスジノミハムシ	2000 倍						
キャベツ	アブラムシ類	2000～ 3000 倍						セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌約 3L) 当り 0.5L
	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	50～ 100 倍						
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (は種前の培土 混和は 1 回 以内、育苗期の 株元散布、定植 時の土壌混和 及び育苗トレイへ の灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)	
	ハスモンヨトウ	50 倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注		
チンゲンサイ	アブラムシ類	3000 倍	100～300L /10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (は種時及び 定植時の土壌 混和は合計 1 回 以内、散布は 2 回以内)	
	キスジノミハムシ	2000 倍						
非結球あぶらな 科葉菜類 (チンゲンサイ を除く) なばな類 かぶ	アブラムシ類	3000 倍						
	キスジノミハムシ	2000 倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	—	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、 粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)
		キスジノミハムシ	1000倍					
クレソン		アブラムシ類	3000倍		収穫3日前まで	3回以内		
ねぎ		アサミウマ類	2000倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約1.5～4.0L) 当り0.5L	定植前日～ 定植時	1回	灌注	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
		アサミウマ類 ハモグリハエ類 シロイチモンジヨトウ タネハエ ネギコガ	50倍					
		クロハネキノコバエ類	1000倍		1L/m ²	生育期 但し、 収穫14 日前まで	株元 灌注	
		アサミウマ類	400倍		0.4L/m ²			
		ハモグリハエ類 トビイロヒョウタンゾウムシ						
にら		ネギアサミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫 前日まで	2回以内	散布	3回以内 (生育期の株元灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		ネギアサミウマ アブラムシ類						
	クロハネキノコバエ類	1000倍						
わけぎ	アサミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内 (定植後の株元散布は1回以内、 生育期の株元灌注は1回以内、 散布は2回以内)	
	アサミウマ類 ハモグリハエ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫14 日前まで	1回	株元 灌注		
アスパラガス	コナジラミ類 アサミウマ類 カメムシ類 ジユウシホシクビナガハムシ	2000倍	100～800L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
らっきょう	アサミウマ類							
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコハネナガカメムシ		100～300L/10a	収穫45日前まで				5回以内 (粒剤は2回以内、 液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)

2019年8月28日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数															
にんじん	—	アブラムシ類	2000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (は種時の 土壌混和は 1 回以内、 生育期の 株元灌注は 1 回以内、散布 は 2 回以内)															
		トビイロヒョウタンゾウムシ クロハネキノコバエ類	400 倍	0.4L/m ²	生育期 但し、収穫 21 日前ま で	1 回	株元 灌注																
セルリー		アブラムシ類	2000 倍	100～300L /10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌 混和は1回 以内、散布は 2 回以内)															
ほうれんそう		アブラムシ類 ウリハムシトキ	3000 倍		収穫 3 日 前まで			3 回以内 (は種時の土壌 混和は1回 以内、散布は 2 回以内)															
しゅんぎく		アブラムシ類			収穫前日 まで			3 回以内 (は種時及び 定植時の土壌 混和は合計 1 回以内、散布 は 2 回以内)															
だいず		カメムシ類 ダイズサヤタマハエ	2000 倍		100～300L /10a			収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内 (は種時の土壌 混和は1回 以内、散布は 2 回以内)												
		フタスジヒメハムシ	3000 倍								3 回以内												
あずき		アブラムシ類	2000 倍								100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内								
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげを除く)		アブラムシ類 ハモグリハエ類													2 回以内								
えだまめ		カメムシ類 ダイズサヤタマハエ アブラムシ類 ハモグリハエ類	3000 倍												100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	2 回以内				
	フタスジヒメハムシ	3000 倍																					
未成熟ささげ	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000 倍	100～300L /10a																収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	2 回以内	
さやいんげん	アブラムシ類 ハモグリハエ類 コナジラミ類																						
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類 ハモグリハエ類 ウラナミシジミ	2000 倍		100～300L /10a		収穫 7 日 前まで	3 回以内															散布	3 回以内 (株元散布は 1 回以内、散布 は 2 回以内)
しょうが	クロハネキノコバエ類																						
オクラ	アブラムシ類																						

2019年8月28日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	—	ワタアブラムシ	2000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
かんしょ		コナジラミ類 アブラムシ類			収穫 3 日 前まで	1 回		1 回	
せり	水田	アブラムシ類			収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内	3 回以内
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設				収穫 3 日 前まで				
すいぜんじな	—	アザミウマ類			収穫前日 まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内
モロヘイヤ					アブラムシ類				
なんてん(葉)		コナジラミ類			3 回以内 (土壌表面散布 は1回以内、 散布は 2 回 以内)				
ふき		アブラムシ類 キンモンホソガ シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類							
りんご	—	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 モモチョッキリゾウムシ			200～700L /10a	収穫前日 まで		3 回以内	3 回以内
もも ネクタリン		オウトウショウジョウバエ カメムシ類							
おうとう	—	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウゴクナシキジラミ	3000 倍	200～700L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	3 回以内		
なし		カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類						3 回以内	4 回以内 (塗布は 1 回 以内、散布は 3 回以内)
かき		フタテンヒメヨコバイ							
ぶどう	—	カメムシ類 ブドウトラカミキリ	2000 倍	200～700L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	3 回以内 (塗布は 1 回 以内)		
		チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～ 2000 倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かんきつ	—	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～ 2000 倍	200～700L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		ゴマダラカミキリ	1000 倍					
小粒核果類	—	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンハエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーセカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノトリヒメヨコバイ アオハハゴロモ	2000 倍	200～400L /10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
		アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	1000～ 2000 倍					
キウイフルーツ	—	カメムシ類	1000～ 2000 倍	200～400L /10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
マンゴー		チャノキイロアザミウマ	2000 倍					
びわ	—	カメムシ類 ヒワキジラミ		2000 倍	200～400L /10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布
あけび(果実)	—	カメムシ類						
オリーブ	—	チャノホソガ チャノトリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コムカンアブラムシ	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	摘採 7 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
オリーブ(葉)		アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ						
茶	—	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ	2000～ 3000 倍	100～300L /10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
		カメノコハムシ	1000～ 2000 倍					
てんさい	—	カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～ 200 倍	5L/ペーパー ポット 6 冊 (2.5L/m ²)	移植前	1 回	灌注	3 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
		アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～ 240 倍					
かんきつ (苗木)	—	ミカンハモグリガ	50 倍	100mL/株	育苗期	5 回以内	株元 灌注	5 回以内
わさび	—	アブラムシ類 ナトビハムシ	2000 倍	100～ 300L/10a	畑育苗期	3 回以内	散布	3 回以内
畑わさび		アブラムシ類			3000 倍			
アマランサス(茎葉) しそ(花穂) しそ科葉菜類 (しそ、バジルを 除く)	—	アブラムシ類	3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内

2019 年 8 月 28 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
しそ	—	アブラムシ類 ウリハムシトキ	3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで	2 回以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌 混和は 1 回 以内、散布は 2 回以内)	
バジル よくようほおずき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用パンジー 食用金魚草 食用トレニア 食用なでしこ 食用プリムラ 食用エキザカム 食用せんいちこ		アブラムシ類 コナジラミ類						2 回以内	
食用ぎく					収穫 7 日 前まで			3 回以内 (定植時の土 壌混和は 1 回 以内、散布は 2 回以内)	
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)		アブラムシ類 コナジラミ類	2000～ 3000 倍		1L/m ²	発生初期	5 回以内	灌注	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)
		ハモグリハエ類	1000 倍						
きく		アブラムシ類 コナジラミ類	2000～ 3000 倍		100～ 300L/10a	散布			
		カメムシ類	2000 倍						
樹木類 (つつじ類、 つばき類を 除く)		ハモグリハエ類	1000～ 2000 倍		1L/m ²	灌注			
		ケムシ類	2000 倍		100～ 700L/10a	散布	5 回以内		
つつじ類		ツツジゲンバイ ケムシ類			100～300L /10a				
つばき類		ケムシ類			100～ 700L/10a	2 回以内	株元 灌注	5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)	
		チャドクガ	100 倍		0.5～2L/樹 (但し、220L /10a まで)				
いね科牧草		アブラムシ類			100～300L /10a	収穫 7 日 前まで			
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、 ススキ、セイタカ アワダチソウ等 の多年生 雑草が優 占している 休耕田	カメムシ類	2000 倍	60～150L /10a	—	3 回以内	散布	3 回以内	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20～40g /樹	発芽前 ～ 発芽期	1 回	本剤 1g 当り水 1mL の割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4 回以内 (塗布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
ぶどう			幼果期まで 但し、収穫 30 日 前まで			3 回以内 (塗布は 1 回以内)
	クビアカスカシバ	40g/樹				