

2020年3月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マゼブを含む農薬の総使用回数
みかん	黒点病	400～800倍	200～700 L/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	小黒点病	600～800倍					
	そうか病	400倍					
	チャキイアザミマ そばかす病 褐色腐敗病	400～600倍					
	カンパビダニ	1000倍					
	炭疽病	600倍					
かんきつ (みかんを除く)	チャキイアザミマ 炭疽病 褐色腐敗病 そばかす病 汚れ果症	600倍		収穫90日前まで			
	黒点病 小黒点病	600～800倍					
	カンパビダニ	1000倍					
かき	炭疽病 落葉病	400～800倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内
なし	黒星病 赤星病	400～600倍		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
	黒斑病 輪紋病	600倍					
りんご	黒星病 赤星病 黒点病 斑点落葉病 褐斑病 炭疽病	500～600倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	輪紋病 すす点病 すす斑病	500倍					
ぶどう	黒とう病 べと病 晩腐病 褐斑病 さび病	1000倍	収穫45日前まで	2回以内	2回以内		
マンゴー	炭疽病	800倍	落弁期まで	3回以内	3回以内		
びわ	たてぼや病	600倍					
もも	黒星病 果実赤点病		600倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内	

2020年3月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	
トマト	疫病 葉かび病	800倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600倍		収穫7日前まで	7回以内		7回以内	
	褐色腐敗病	600倍						
メロン	つる枯病 べと病	400～600倍		仮植栽培期 但し 収穫76日前まで	6回以内		5回以内	5回以内
いちご	炭疽病	600倍					収穫21日前まで	2回以内
かぼちゃ	べと病 疫病			収穫前日まで	3回以内		3回以内	
きゅうり	炭疽病 褐斑病 黒星病							600～800倍
	べと病	400～600倍		収穫30日前まで	3回以内		1回	
キャベツ	べと病	600倍						収穫14日前まで
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病			400～600倍				
	ねぎ		べと病 黒斑病 さび病					
たまねぎ	べと病 黒斑病 灰色かび病	400～600倍	収穫3日前まで	5回以内	5回以内			
ばれいしょ	疫病 夏疫病	100倍	25L/10a	収穫7日前まで	10回以内	10回以内 (無人航空機散布は3回以内)		
	疫病							
さといも		500倍	100～300 L/10a	収穫21日前まで	4回以内	4回以内		
やまのいも	炭疽病 葉渋病	400～600倍						
てんさい	褐斑病	125倍	25L/10a	収穫21日前まで	5回以内	5回以内		
だいず	べと病	400倍	100～200 L/10a	収穫45日前まで	3回以内	3回以内		
にんにく	葉枯病	400～600倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	5回以内	5回以内		

2020年3月11日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
さんしょう (果実)	さび病	600倍	200～700 L/10a	最終収穫後 から落葉期 まで	3回以内	散布	3回以内
オリーブ	炭疽病			収穫90日 前まで	2回以内		2回以内
アスパラガス (露地栽培)	褐斑病	500倍	100～300 L/10a	収穫終了後 但し、秋期 まで	6回以内		6回以内
	斑点病 茎枯病						6回以内
樹木類	炭疽病 斑点症 (シュート・サウスポー菌)	600倍	200～ 700L/10a	発病初期	4回以内	4回以内	
	枝枯細菌病			新梢伸長期 ～発病初期			