

2020年4月8日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアントリプロール を含む農薬の 総使用回数		
未成熟とう もろこし	ギグレンアラムシ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内		
	アラムシ 材カゴ	4000 倍							
えだまめ	アラムシ類	2000 倍						収穫 7 日 前まで	
	ハスモンヨトウ マメシクイガ	2000～ 4000 倍							
だいず	アラムシ類	2000 倍		収穫前日 まで					
	ハスモンヨトウ	4000 倍							
さやいん げん	ハスモンヨトウ	4000 倍		収穫 7 日 前まで					
	ハメグリバエ類	2000 倍							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカシロシタガ アラムシ ヨシカメコバシ	4000 倍		収穫 7 日 前まで					
	ハスモンヨトウ	2000 倍							
ばれい しょ	アラムシ類	2000 倍		4000 倍					
	ナカイモコガ ハスモンヨトウ アラムシ類								
だいこん	コナガ アラムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ ダイコンカメシ	2000～ 4000 倍		3 回以内				散布	4 回以内 (は種時の土壌混和 は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
	ヨトウムシ	4000 倍							
	アラムシ類 ハメグリバエ類 キジノミムシ	2000 倍							
はくさい	コナガ アラムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	2000～ 4000 倍	収穫前日 まで	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植 後の散布は 3 回以内)					
	アラムシ類 キジノミムシ	2000 倍							
キャベツ	コナガ アラムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウリバエ類 オタバコガ	2000～ 4000 倍	2000 倍						
	アサミマ類 アラムシ類								
ブロッコリー	アラムシ ハスモンヨトウ コナガ	2000～ 4000 倍	2000 倍						
	アサミマ類 アラムシ類								
レタス 非結球レタス	オタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～ 4000 倍	2000 倍						
	ハメグリバエ類 アラムシ類								

2020年4月8日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアンコリア® ロールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	シイモシヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の処理は3回以内(但し、株元 灌注は1回以内))
たまねぎ	ハモグリバエ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ シイモシヨトウ			収穫14日前まで			
アスパラガス	ハスモンヨトウ	4000倍					
	アザミウマ類	2000倍					
にんじん	アブラムシ類	4000倍					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ						
トマト ミニトマト	オタハコガ	2000～ 4000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類			2000～ 4000倍			収穫前日まで
	オタハコガ						
ししとう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					
	オタハコガ	2000～ 4000倍					
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	2000倍					
	ハモグリバエ類						
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	4000倍					
オクラ	アブラムシ類	2000倍	収穫開始3日前まで				
いちご	ハスモンヨトウ	2000～ 4000倍	収穫前日まで				
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	2000倍					
たばこ	ヨトウムシ	4000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内