

2014年12月17日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロック スを含む 農薬の 総使用回数		
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ	1000倍	60～ 150L/ 10a	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内		
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	300倍	25L/10a						
小麦		アブラムシ類	1000倍	60～ 150L/ 10a	100～ 300L/ 10a	2回以内		2回以内		
ばれいしょ				収穫 7日前 まで		3回以内		3回以内		
やまのいも		マメシクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類		収穫 14日前 まで		2回以内		2回以内		
だいず えだまめ				収穫 前日 まで		3回以内		3回以内		
さやえんどう 実えんどう		ウラナミシジミ シロイチモジヨトウ		3回以内		3回以内				
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類		2回以内		2回以内				
すいか		アブラムシ類		収穫 3日前 まで		4回以内		4回以内		
メロン				収穫 前日 まで		2回以内		2回以内		
トマト		コナジラミ類		アブラムシ類		収穫 3日前 まで		3回以内	3回以内	
なす		コナジラミ類				収穫 7日前 まで				
キャベツ		アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ		収穫 21日前 まで		2回以内		2回以内		
はくさい		シロイチモジヨトウ								
だいこん										
ねぎ										

2014 年 12 月 17 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロク スを含む 農薬の 総使用回数				
レタス	—	アブラムシ類	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内				
てんさい		ヨトウムシ										
エンサイ		イモコガ										
うど		アブラムシ類						根株 養成期 但し、 収穫 45 日前まで	2 回以内	2 回以内		
きく		シロイチモジヨトウ	2000 倍	100～ 700L/ 10a	発生初期	6 回以内		6 回以内				
宿根かすみ そう											—	
たदैあい									アブラムシ類 ハスモンヨトウ			
樹木類 (つつじ類、 いぬまきを 除く)		ケムシ類	1000 倍	100～ 700L/ 10a	発生初期	6 回以内		6 回以内				
つつじ類		ツツジゲンバイ	2000 倍									
いぬまき		モンアシブトゾウムシ ケブカトラカミキリ ケムシ類	2000 倍									
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ 等の多年 生雑草が 優占して いる休耕 田	カメムシ類	1000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	3 回以内					