


水稲用 中期 除草剤

● 畦から侵入する
厄介な雑草に!

● 高葉令のノビエに!

農林水産省登録
第21673号



カービー®

シハロホップブチル・
ベンゾビシクロン・
MCPB粒剤

1キロ粒剤

カービーは三井化学アグロ(株)の登録商標です

● SU抵抗性ホタルイ、
アゼナ類、コナギにも!



ベンゾビシクロン

白化して
枯らす!

シハロホップブチル

ノビエ・アゼガヤ
などに!

MCPB

広葉雑草に!



三井化学アグロ株式会社

カービー® 1キロ粒剤

●有効成分：
シハコホップチル…1.8%
ベンゾピシクロン…2.0%
MCPB…2.4%

●人畜毒性：普通物※
※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

●ノビエから多年生雑草まで効果を発揮!!

ノビエ、コナギ等の一年生雑草から、ホタルイ、ミズガヤツリ等の多年生雑草まで幅広い雑草に効果を発揮します。

●SU抵抗性雑草対策に!!

スルホニルウレア系除草剤に感受性が低下したホタルイ類、アゼナ類、コナギに対しても高い効果が期待できます。

●畦畔から侵入する雑草に高い効果!!

アゼガヤ、イボクサ等の畦畔から侵入する雑草に対しても高い効果が期待できます。

●直播水稻で使用可能!!

使用基準

2015年3月1日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当りの使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ (関東・東山・東海、 近畿・中国・四国、九州)	移植後20日～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土 ～ 埴土	1kg	1回	湛水 散布	北陸・関東・東山・東海の 普通期及び早期栽培地帯
		移植後15日～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで					近畿・中国・四国、九州の 普通期及び早期栽培地帯
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ	稲4葉期～ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで					全域(北海道、東北を除く)


シハコホップチルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数	MCPBを含む 農薬の総使用回数
3回以内	2回以内	2回以内

使用時期

体系での使用方法

(移植前後または移植後の除草剤と体系で使用してください。)

●一般的な圃場



●SU抵抗性雑草対策圃場 (SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナ類)等が発生している圃場)



●直播水稻



※乾田直播では、入水前散布の除草剤との体系で使用してください。

注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にブレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリ、ウリカワ(移植水稻)は2葉期まで、ウリカワ(直播水稻)は発生始期まで、ヒルムシロは発生期までが本剤の散布適期です。
- 苗の植付けが均一となるように代かきを丁寧に行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に丁寧に行ってください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～5日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、落水、かけ流しはしないでください。また、止水期間中の入水は静かに行ってください。
- 移植前後または移植後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用し、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布してください。
- 乾田直播では、入水前散布の除草剤との体系で使用してください。
- 乾田直播の場合は入水後、しばらくは漏水が多く、効果不足や薬害の出るおそれがあるので漏水が少なくなってから散布してください。
- 下記のような条件では薬害が発生する恐れがあるので使用を避けてください。
 - 1)砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - 2)軟弱な苗を移植した水田
 - 3)極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田
 - 4)稲の根が露出している水田
- 本剤はホルモン作用を持つ除草剤で、処理後低温が続く場合は稲苗の生育抑制などの薬害を生じるおそれがあるので、処理時期の平均気温が15～16℃以下になるような場合には使用を避けてください。
- 本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガム等のイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないでください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 河川、湖沼、地下水等を汚染しないよう、落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前には、ラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。
- 防除日誌をつけましょう。

*本製品は農業用除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は2015年3月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

取扱い



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>