

コロマイト水和剤(第19656号)

2016年7月20日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ハダニ類 チャノホリダニ カンキツジラミ	2000倍	500～ 700L/10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍							
りんご	ハダニ類	2000倍	400～ 700L/10a	収穫前日 まで	1回			散布	2回以内
なし			200～ 700L/10a	収穫7日 前まで	2回以内				
いちじく									
ぶどう									
すいか									
メロン									
きゅうり なす ふき									
いちご	シクラメンホリダニ	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2回以内					
食用ぎく	ハダニ類	2000倍	100～ 200L/10a	発生初期	1回	2回以内			
きく									
ばら									
りんどう									
げっきつ					カギゾウ		100～ 300L/10a		

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス 室等密閉で きる場所	ハダニ類	200g/10a	20L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	常温 煙霧	2回以内
大粒種 ぶどう			150g/10a	15L/10a				