

2016年12月14日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シモナゾールを 含む農薬の 総使用回数	マンゼブを 含む農薬の 総使用回数				
りんご	うどんこ病 モニリア病 すす点病 すす斑病 褐斑病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 黒点病	600～ 800倍	200～ 700L /10a	収穫30日 前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内				
なし	褐色斑点病	600倍		収穫45日 前まで	2回以内		2回以内	2回以内	5回以内			
かき	うどんこ病 落葉病 炭疽病								500～ 600倍	収穫30日 前まで	3回以内	3回以内
みかん	そうか病	600倍		収穫90日 前まで	3回以内		3回以内	4回以内				
かんきつ (みかんを 除く)	黒点病 灰色かび病		1000倍						収穫45日 前まで	2回以内	2回以内	2回以内
ぶどう	べと病 黒とう病 晩腐病 うどんこ病 灰色かび病	600～ 800倍		100～ 300L /10a	収穫7日 前まで		5回以内	5回以内				
すいか	炭疽病 うどんこ病 つる枯病		600～ 800倍						収穫前日 まで	3回以内	3回以内	3回以内
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病											
きゅうり	べと病 うどんこ病 炭疽病 灰色かび病 褐斑病	600倍	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内 (は種時は 1回以内)		3回以内					
トマト	疫病 葉かび病 うどんこ病							600倍	3回以内	3回以内	3回以内	
ねぎ	さび病 べと病 黒斑病 葉枯病											

2016年12月14日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シロザールを 含む農薬の 総使用回数	マンゼブを 含む農薬の 総使用回数
にんにく	さび病 葉枯病 白斑葉枯病	600 ～ 800 倍	100～ 300L /10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	6回以内 (植付前は 1回以内、 植付後の 株元散布は 2回以内、 散布は 3回以内)	5回以内
かぼちゃ	べと病 うどんこ病 疫病			収穫21日 前まで	2回以内		2回以内	2回以内