

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| りんご | 紋羽病 | 1穴当り6~12ml | | 土壌くん蒸 | 1回 |
| いちじく(苗木) | 白絹病、センチュウ類 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| あぶらな科野菜 (キャベツ、こまつなを除く) | 萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 2回以内(床土1回以内) |
| こまつな | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| だいこん | 亀裂褐変症 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 1回 |
| はくさい | 黄化病、軟腐病、根くびれ病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| キャベツ | 萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
| レタス、非結球レタス(サラダ菜を除く) | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3ml | 1回 | | 1回 |
| | 根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| サラダ菜 | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
| | 根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| くきちしゃ | ビッグベイン病 | <圃場>1穴当り3ml | 1回 | | 1回 |
| | 根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ほうれんそう | 萎凋病、立枯病、苗立枯病、ホウレンソウケナゴコナダニ、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 2回以内(床土1回以内) |
| ピーマン、とうがらし類 | 萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| トマト、ミニトマト | 青枯病、萎凋病、半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| なす | 青枯病、半身萎凋病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | 2回以内(床土1回以内) | |
| うり科野菜(すいか、きゅうり、メロン、にがうり、うり類(漬物用)を除く) | つる割病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | 1回 | |
| 漬物用メロン | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| メロン | つる割病、白絹病、黒点根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | 土壌くん蒸 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
| にがうり | 疫病、つる割病、白絹病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 2回以内(床土1回以内) |
| うり類(漬物用、ただし、漬物用メロンを除く) | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| きゅうり | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
| かぼちゃ(かぼちゃ台を含む) | フザリウム立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml <圃場>1穴当り3~4ml | 1回 | | 1回 |
| | 一年生雑草 | <圃場>1穴当り3~4ml | | | |
| すいか | つる割病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| | ホモフス根腐病 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| いちご | 萎黄病、炭疽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| アスパラガス | 立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 2回以内(床土1回以内) |
| セルリー | 萎黄病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| しょうが | 根茎腐敗病、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 2回以内(床土1回以内) |
| 葉しょうが | | <床土・堆肥>1穴当り3ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| うど | 萎凋病、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 1回 |
| にんじん | センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ごぼう | 黒あざ病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内) | 2回以内(床土1回以内) | |
| かんしょ | 立枯病、つる割病、紋羽病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | 1回 | |
| さといも | 疫病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|-------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| やまのいも | 褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | 土壌くん蒸 | 1回 |
| やまのいも(むかご) | | <床土・堆肥>1穴当り3ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ばれいしょ | そうか病 | <圃場>1穴当り3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| | 青枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) |
| ねぎ | 白絹病、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | 1回 |
| あさつき、わけぎ | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| たまねぎ | 苗立枯病、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 1回 |
| パセリ | 立枯病、一年生雑草 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| にんにく | イモガサレセンチュウ、一年生雑草 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| 薬用にんじん | 根腐病、一年生雑草 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| こんにゃく | 乾腐病、白絹病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| 豆類(種実、ただし、いんげんまめを除く)、豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | 立枯病、白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| さやえんどう、実えんどう、いんげんまめ | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| さやいんげん | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| 未成熟そらまめ | | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ふき、ふき(ふきのとう) | 半身萎凋病 | <圃場>1穴当り3ml | | 1回 | |
| らっきょう | 白絹病 | <圃場>1穴当り3ml | | | |
| みつば | 立枯病 | <圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| てんさい | 黒根病、苗立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| あま、麦類 | 立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 |
|----------|---|-------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| とうもろこし | 白絹病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | 土壌くん蒸 | 1回 |
| 陸稲 | センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| 花き類・観葉植物 | 青枯病、半身萎凋病、萎凋病(フザリウム菌)、萎黄病(フザリウム菌)、株枯病(フザリウム菌)、乾腐病(フザリウム菌)、球根腐敗病(フザリウム菌)、立枯病(フザリウム菌)、葉枯病(フザリウム菌)、腐敗病(フザリウム菌)、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) |
| きく | 白絹病、立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| カーネーション | 立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | | |
| りんどう | 褐色根腐病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ストック | 苗立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| デルフィニウム | 立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| スターチス、ゆり | 萎凋細菌病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| ほおずき | 軟腐病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| トルコギキョウ | 株腐病、苗立枯病 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | | | |
| 桑 | 紋羽病 | 1穴当り6~12ml | | | |
| たばこ | 白絹病、立枯病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草 | <床土・堆肥>1穴当り3~6ml<圃場>1穴当り2~3ml | 1回 | | 1回 |