

サンリット水和剤（第20980号）

2017年4月11日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | シメオザールを 含む農薬の 総使用回数 | |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|-------------|----------|---------------------------|------|
| りんご | 褐斑病 黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病 斑点落葉病 | 2000～ 4000倍 | 200～700 L/10a | 収穫7日 前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| なし | 黒星病 赤星病 うどんこ病 | 4000倍 | | | | | | |
| ネクタリン | 灰星病 | 2000～ 4000倍 | 100～300 L/10a | 収穫前日 まで | 2回以内 | | | 2回以内 |
| もも | | 2000倍 | | | | | | |
| 小粒核果類 | | 2000～ 4000倍 | | | | | | |
| おうとう | | 2000倍 | | | | | | |
| いちご | 幼果菌核病 | 2000倍 | 100～300 L/10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | | | 3回以内 |
| | 炭疽病 うどんこ病 | 2000～ 4000倍 | | | | | | |
| だいた | 紫斑病 | 1000～ 2000倍 | 100～300 L/10a | 収穫14日 前まで | 2回以内 | | | 2回以内 |
| しょうが | 白星病 | 1000倍 | | 収穫7日 前まで | 5回以内 | | | 5回以内 |
| しそ | さび病 | 5000倍 | | 収穫前日 まで | 3回以内 | 3回以内 | | |
| 茶 | 炭疽病 もち病 | 2000～ 4000倍 | 200～400 L/10a | 摘採7日 前まで | 1回 | 1回 | | |
| さくら | 幼果菌核病 | 2000倍 | 200～700 L/10a | 展葉始期 ～展葉期 | 3回以内 | 3回以内 | | |