

2017年12月25日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、 パナップル を除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
かんきつ		一年生雑草		250～500 mL/10a				5回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
だいず		一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a		2回 以内		
			は種後出芽前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)					
畦間処理： 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫前日 まで			2回 以内					
えだまめ			は種7日前まで (雑草生育期)			1回		
小麦	圃場 内の 周縁部	多年生イネ科 雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～1000 mL/10a	25～100L/10a	3回 以内	3回以内	
		一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a				
			耕起7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	500～1000 mL/10a				100L/10a
	圃場 内の 周縁部		収穫7日前まで (雑草生育期)	250mL/10a	25～100L/10a	3回 以内		
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	100L/10a	1回		
			は種後出芽前 (雑草生育期)		25～100L/10a			
かんしょ					耕起又は挿苗 7日前まで (雑草生育期)			100L/10a

2017年12月25日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
野菜類 (えだまめ、キャベツ、 はつかだいこん、 だいこん、とうがらし類、にんじん、 ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、 ホウレンソウ(葉)、きゅうり、 じゃくやく(薬用)、たらんぎ、 トマト、なす、びわ(葉)、 ほうれんそう、レタス、薬用にんじんを除く)	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	1回
とうがらし類 にんじん ピーマン								2回以内
アスパラガス ホウレンソウ(葉) きゅうり じゃくやく(薬用) たまねぎ たらんぎ トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス								3回以内
薬用にんじん								10回以内 (1年間に 2回以内)
キャベツ								1回
だいこん								2回以内
はつかだいこん								1回
				耕起又はは種 7日前まで (雑草生育期)		100L/10a		

2017年12月25日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ねぎ	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			定植後畦間処理 但し、収穫30日 前まで (雑草生育期)					
さとうきび (春植え)	—	多年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	500～1000 mL/10a	少量散布 25～50L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	6回以内
茶		一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a				100L/10a
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	耕起20～10日前 (雑草生育期)							
水田作物 (水田刈跡)	水田 刈跡	多年生雑草	雑草生育期	500～1000 mL/10a	25～100L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	1回
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
水田作物、 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	4回 以内	雑草 茎葉 散布	4回以内
樹木類	—		雑草生育期					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL/10a	通常散布 100L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000 mL/10a	少量散布 25L/10a			
		スギナ	生育盛期	2000 mL/10a	少量散布 25～50L/10a			
林木	造林地（地ごしらえ）	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、落葉雑かん木	生育盛期以降	1000 mL/10a	20～30L/10a	3回以内	雑草木茎葉散布	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ	春期又は秋期	原液又は2倍液	1～2mL/株	—	株頭注入処理	—
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	落葉雑かん木	5～10月		1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2～3 10～20cm 4～8 20cm以上 10		立木注入処理	
		雑かん木	伐採直後		切り口全体に十分量を塗布		植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理	
林木畑作物	林地 放置竹林畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～15mL/本		竹稈注入処理	