

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、 パナップル を除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
かんきつ		一年生雑草		250～500 mL/10a				5回以内
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
豆類 (種実、ただ し、だいず、 らっかせい を除く)	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)  は種後出芽前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)  畦間処理： 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫前日 まで	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
だいず								1回
								えだまめ
小麦								
	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期)	250～500 mL/10a					
	多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	500～1000 mL/10a	100L/10a	1回			
	圃場 内の 周縁部	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250mL/10a	25～100L/10a	3回 以内		
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	100L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	3回以内
かんしょ			は種後出芽前 (雑草生育期)		25～100L/10a			
			耕起又は挿苗 7日前まで (雑草生育期)		100L/10a			

2018年2月14日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
野菜類 (えだまめ、キャベツ、 はつかだいこん、 だいこん、とうがらし類、にんじん、 ピーマ、ねぎ、たまねぎ、アスパカス、 オリーブ(葉)、きゅうり、 しゃくやく(薬用)、たらんき、 トマト、なす、びわ(葉)、 ほうれんそう、レタス、薬用にんじんを除く)	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	1回
とうがらし類 にんじん ピーマン								2回以内
アスパカス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たらんき トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス								3回以内
薬用にんじん								10回以内 (1年間に 2回以内)
キャベツ								1回
だいこん								2回以内
はつかだいこん								1回
					耕起又はは種 7日前まで (雑草生育期)			

2018年2月14日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ねぎ たまねぎ	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			定植後畦間処理 但し、収穫30日 前まで (雑草生育期)					
耕起20～10日前 (雑草生育期)								
水田作物 (水稲を除く)		多年生雑草	湛水前30～5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500～1000 mL/10a	50L/10a	1回		2回以内
移植水稲			一年生雑草	250～500 mL/10a	100L/10a			
直播水稲		一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	25～50L/10a	2回 以内		
			多年生雑草	500 mL/10a	50L/10a			
		一年生雑草	は種30日前～ 出芽前 (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	25～50L/10a			
		多年生雑草	乾田不耕起栽培)	500 mL/10a	50L/10a			
水田作物 (水田刈跡)		水田 刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500 mL/10a	25～100L/10a		
	多年生雑草		500～1000 mL/10a					
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期： 草丈30cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a	2回 以内	3回以内	
		多年生雑草		500～1000 mL/10a				
水田作物 畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	250～500 mL/10a	通常散布 50～100L/10a 少量散布 25～50L/10a	2回 以内	3回以内	

2018年2月14日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
さとうきび (春植え)	—	一年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	6回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a			
茶	—	一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50L/10a	4回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
樹木類	雑草生育期		通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a		4回 以内			
牧草	牧野、 草地 (更新・ 造成)	多年生雑草	更新・造成の 10日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	50L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前~ は種当日 (耕起整地後： 雑草発生揃期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50L/10a			
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL/10a	通常散布 100L/10a	3回 以内	植栽 地を 除く 樹木 等の 周辺 地に 雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		1000 mL/10a	少量散布 25L/10a			
林木	造林地 (地ごし らえ)	ススキ、 ササ類、 クズ等の 多年生雑草、 落葉雑かん木	生育盛期	2000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a	3回 以内	雑草 木 茎葉 散布	
			生育盛期以降	1000 mL/10a	20~30L/10a			

2018年2月14日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ	春期 又は 秋期	原液又は 2倍液	1~2mL/株	-	株頭注入 処理	-
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等	落葉 雑かん木	5~ 10月		1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10		立木注入 処理	
		雑かん木	伐採 直後		切り口全体に 十分量を塗布		植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	
林木 畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏~ 秋期	原液	5~15mL/本		竹稈注入 処理	