

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チウラムを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病 輪紋病	500倍	200～ 700L/10a	収穫30日 前まで	5回以内	散布	5回以内
なし	黒斑病 黒星病 赤星病 心腐れ症(胴枯病菌) 炭疽病 褐色斑点病	500倍					
もも	黒星病 灰星病	500倍		収穫7日前 まで	2回以内		5回以内
ネクタリン	縮葉病 せん孔細菌病	500倍		収穫30日 前まで			
かき	落葉病 炭疽病 うどんこ病	500倍		収穫14日 前まで	3回以内		2回以内(休眠 期は1回以内)
すもも	ふくろみ病 炭疽病	500倍		収穫21日 前まで	2回以内		3回以内
あんず	かいよう病	500倍			2回以内		2回以内
うめ	黒星病	500倍			5回以内		5回以内(萌芽 後は2回以内)
ぶどう	晩腐病 べと病 灰色かび病 褐斑病	1000倍		収穫60日 前まで	2回以内		3回以内(休眠 期は1回以内、 生育期は2回 以内)
いちご		500倍		100～ 300L/10a	育苗期		5回以内
	炭疽病	500倍	生育期但し 収穫開始 21日前まで		2回以内		
りんどう	褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病	500倍	100～ 500L/10a	発病初期	6回以内	6回以内	
花き類・観 葉植物(り んどうを除 く)	灰色かび病	500倍					