

アニキ乳剤（第22696号）（1/4）

2018年7月13日現在

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピクチンを 含む農薬の 総使用回数					
みかん	カンホクリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4回 以内	散布	4回以内					
	チャノキイロアザミマ アゲハ類	1000～ 4000倍										
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍										
	チャノホクリダニ	4000倍										
かんきつ (みかんを除く)	カンホクリガ	1000～ 2000倍		100～300 L/10a				収穫3日 前まで	3回 以内	散布	3回以内	
	チャノキイロアザミマ アゲハ類	1000～ 4000倍										
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍										
	チャノホクリダニ	4000倍										
未成熟 とうもろこし ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍	100～300 L/10a		収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内				
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～ 3000倍										
豆類(未成熟、た だし、えだまめ、 さやえんどうを 除く)		2000倍										
さやえんどう		ハモグリバエ類										1000倍
かんしょ		ハスモンヨトウ ナカジロシタバ		2000～ 3000倍								
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍		100～300 L/10a					収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
いちご	オオタバコガ	1000～ 2000倍										
	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ	2000倍										
トマト ミニトマト	コナジラミ類 カンキイロアザミマ	1000～ 2000倍										

2018年7月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピメチンを含 む農薬の 総使用回数	
ピーマン とうがらし類	コナジラミ類	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ オオタバコガ チャホリダニ	2000倍						
なす	ハスモンヨトウ コナジラミ類	1000～ 2000倍						
	オオタバコガ ハモグリバエ類 チャホリダニ	2000倍						
きゅうり	コナジラミ類	1000倍						
	ハスモンヨトウ	2000倍						
すいか	オオタバコガ	1000倍						
メロン	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍			4回 以内		4回以内	
ほうれんそう セルリー	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍			収穫3日 前まで		3回 以内	3回以内
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハマダラメカ ウワバ類 オオタバコガ							
	キジノミムシ							
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハマダラメカ オオタバコガ カブラハバチ	1000～ 2000倍						
ブロッコリー	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ	2000倍						
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ							

アニキ乳剤（第22696号）（3/4）

2018年7月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピクチンを含 む農薬の 総使用回数
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ ハスモンヨトウ キジノミムシ ハモグリバエ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫3日 前まで			
非結球レタス				収穫前日 まで			
アスパラガス	コナジラミ類	1000倍		収穫3日前 まで			
たまねぎ	ハスモンヨトウ	2000倍					
ねぎ	シイモジヨトウ ネギコガ	1000～ 2000倍		収穫3日前 まで			
	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	1000倍					
だいこん	コナガ アオムシ ハマダラメイト カブラハバチ	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
かぶ	コナガ	1000倍					
		キジノミムシ					
しそ(花穂)	ハスモンヨトウ	2000倍					
しそ科葉菜類 (しそを除く)							
しそ			ハスモンヨトウ シソサビダニ				
茶	チャノカクモンハマキ	1000～ 2000倍	200～400 L/10a	摘採7日 前まで	2回 以内		2回以内

2018年7月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピクチンを含 む農薬の 総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
食用ぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫 3 日前 まで			
きく	マハモグリバエ	1000 倍		発生初期	6 回 以内		6 回以内
	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍					
カーネーション	オオタバコガ						
ストック	コナガ						
りんどう	リンゴハハキ						