

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトランを含む農薬の総使用回数	
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
	ハモグリバエ類 アザミウマ類		定植時		植穴土壌混和		
	コナジラミ類	1g/株	育苗期		株元散布		
	アブラムシ類		生育期 但し、収穫開始14日前まで				
コナジラミ類 アブラムシ類	1~2g/株	定植時	植穴土壌混和				
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株					
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期		1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
			定植時	植穴土壌混和			
	コナジラミ類	1~2g/株	育苗期	株元散布			
			定植時	植穴土壌混和			
ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	株元散布				
アザミウマ類		定植時					
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	定植時	1回		植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期 但し、収穫21日前まで			株元散布	
			育苗期				
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗レイへの灌水は合計1回以内、散布は2回以内)	
にかうり	コナジラミ類				3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)		

2019年11月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメトランを含む農薬の総使用回数	
ズッキーニ	コナジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	4回以内 (定植時の土 壌混和は1回 以内、定植後 の株元散布は 1回以内、 散布は 2回以内)	
	アブラムシ類				1g/株		生育期 但し、 収穫開始14 日前まで
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期		株元散布	3回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壌混 和は合計1回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2回以内)	
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴 土壌混和		
	コナジラミ類		育苗期		株元散布		
	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴 土壌混和			
	コナジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、 収穫前日まで	2回以内	株元散布		
ピーマン	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	3回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壌混 和は合計1回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2回以内)	
	アブラムシ類	1g/株					生育期 但し、 収穫前日まで
			育苗期				
トマト ミニトマト	コナジラミ類	培土1L 当り 10g	は種前	1回	培土混和	5回以内 (培土混和及 び灌漑は合計 1回以内、育 苗期の株元散 布は1回以内 、定植時の土 壌混和は1回 以内、散布及 び定植後の株 元散布は合計 2回以内)	
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴 土壌混和		
			育苗期	株元散布			
	コナジラミ類	1g/株	生育期 但し、 収穫前日まで		2回以内		
アブラムシ類	定植時		植穴 土壌混和				
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	4回以内 (育苗期の株 元散布及び定 植時の土壌混 和は合計1回 以内、定植後 の株元散布は 1回以内、散 布は 2回以内)	
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫開始14 日前まで				株元散布
			育苗期				
コナジラミ類							

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
とうがらし(葉)	アザミウマ類 アブラムシ類	1g/株	定植時 但し、収穫 30 日前まで	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の 土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)	
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	育苗期		株元散布	植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株 元散布、定 植時の土壌 混和及び灌 注は合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
	アオムシ コナガ	2~3g/株	定植時		株元散布		
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
はくさい	アブラムシ類	2g/株	定植時		株元散布	植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土 壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
	アオムシ コナガ	2~3g/株					
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2g/株	定植時		株元散布	植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土 壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	は種時		2 回以内	播溝 土壌混和	4 回以内 (は種時の土 壌混和、育 苗トレイへの 灌注及び定 植時の株元 散布は合計 1 回以内、生 育期の株元 灌注は1回 以内、散布 及び定植後 の株元散布 は合計 2 回 以内)
			定植時			株元散布	
	アザミウマ類 クロバネキノコバエ類	6~9kg /10a	生育期 但し、 収穫 3 日前 まで				
わけぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6kg/10a	生育期 但し、 収穫 21 日前 まで	1 回	株元散布	4 回以内 (定植後の株元 散布は1回以 内、生育期の 株元灌注は1 回以内、散布 は 2 回 以内)	
らっきょう	アザミウマ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫前 日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1 回	播溝 土壌混和	4 回以内 (は種時の土 壌混和は 1 回以内、生 育期の株元 灌注は 1 回 以内、散布 は 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴 土壌混和	3回以内 (定植時の 土壌混和は 1回以内、 散布は2回 以内)	
だいこん	キスジノミハムシ	6kg/10a	は種時		播溝 土壌混和	5回以内 (は種時の播溝 土壌混和は 1回以内、は種 時の全面土壌 混和は1回 以内、粒剤の 散布は1回 以内、水溶剤 及び液剤の 散布は合計 2回以内)	
		4~6kg/10a			全面 土壌混和	散布	
		9~12kg/10a			タネバエ		
	定植時	土壌混和	3回以内 (は種時及び 定植時の土 壌混和は合 計1回以内、 散布は 2回以内)				
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6kg/10a	は種時		播溝 土壌混和	3回以内 (は種時の土 壌混和は 1回以内、 散布は2回 以内)	
非結球あぶら な科葉菜類 (チンゲンサイ を除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ		定植時		は種時	植穴 土壌混和	4回以内 (は種前の 培土混和は 1回以内、 育苗期の株 元散布、定 植時の土壌 混和及び育 苗トレイへの 灌注は合計 1回以内、 散布は2回 以内)
かぶ	アブラムシ類						
なばな類 ほうれんそう							
レタス 非結球レタス	ナモグリハエ	培土1L 当り 15g	は種前		培土混和	4回以内 (は種前の 培土混和は 1回以内、 育苗期の株 元散布、定 植時の土壌 混和及び育 苗トレイへの 灌注は合計 1回以内、 散布は2回 以内)	
		1g/株	育苗期後半		株元散布		
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時		播溝 土壌混和	3回以内 (は種時及び 定植時の土 壌混和は合 計1回以内、 散布は 2回以内)	
			定植時		植溝 土壌混和		
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株			植穴 土壌混和	1回	

2019年11月20日現在

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内
なし(苗木)	アブラムシ類	20g/株 (但し、10a 当り110kg まで)		1回		1回
くわい		3kg/10a	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内
ふき		20kg/10a	定植後～ 生育期 (草丈20cm頃 まで) 但し、収穫45日 前まで	1回	土壤表面 散布	3回以内 (土壤表面 散布は1回 以内、散布は 2回以内)
しょうが	クロバネキノコバエ類	9kg/10a	生育期 但し、 収穫14日前 まで		株元散布	3回以内 (株元散布は 1回以内、 散布は 2回以内)
オクラ さやいんげん	アブラムシ類		生育期 但し、 収穫開始14日 前まで			
さやえんどう 実えんどう	ハモグリバエ類					
だいず	フタスジヒメハムシ	6kg/10a	は種時	2回以内	播溝 土壤混和	3回以内 (は種時の 土壤混和は 1回以内、 散布は2回 以内)
さとうきび	カンシャコバネナガカメムシ	6～9kg/10a	生育期 但し、 収穫45日前 まで		散布	5回以内 (粒剤は 2回以内、 液剤、水溶 剤及び水和 剤は合計 3回以内)
	メイチュウ類	9kg/10a				
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	全面土壤 混和	2回以内 (は種時の全面 土壤混和は1回 以内、生育期の 株元散布は1回 以内)
			生育期 但し、 収穫21日前 まで		株元散布	
しそ	マデイラコナカイガラムシ	2g/株 (但し、10a 当り 25kgまで)	定植時	1回	植穴 土壤混和	3回以内 (定植時の土 壤混和は1回 以内、散布は 2回以内)
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kgまで)				
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、10a 当り 30kgまで)				
茶	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前 まで	2回以内	株元 土壤混和	2回以内

2019年11月20日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
きく ガーベラ	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (土壌混和 は1回以内)
	コナジラミ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)				
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5 回以内	株元散布	
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラを 除く)	コナジラミ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a 当り 30kg まで)	定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (土壌混和 は1回以内)
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5 回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジグンバイ	6kg/10a	発生初期			5 回以内