

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チヤミルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ジヤカ [®] イロシストセンチュウ ジヤカ [®] イロシストセンチュウ	30kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回
	ネグサレセンチュウ	20kg/10a			植溝処理 土壌混和	
なす	アブラムシ類		1.5~2.5g/株		育苗期	株元処理
	ミミキイロサ [®] ミマ	1~2.5g/株				
ピーマン	アブラムシ類	1.5~2.5g/株	定植前		全面土壌混和	
	ネコブセンチュウ	50kg/10a				
メロン(地床)	ミミキイロサ [®] ミマ	1~2.5g/株	育苗期		株元処理	1回
メロン(揚床)		1g/株				
メロン	ネコブセンチュウ	40~50kg/10a	定植前		全面土壌混和	
きゅうり	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25~50kg/10a	は種前又は 定植前		全面土壌混和	
	アブラムシ類	1~2.5g/株	定植前	株元処理		
	ミミキイロサ [®] ミマ		育苗期			
すいか	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25~35kg/10a	は種前又は 定植前	全面土壌混和		
	ミミキイロサ [®] ミマ	1~2.5g/株	育苗期	株元処理		
	アブラムシ類	1.5~2.5g/株	定植時	植穴処理		
とうがん	ミミキイロサ [®] ミマ	2.5g/株	定植前	全面土壌混和		
にがうり	ネコブセンチュウ	40kg/10a	定植前			
レタス	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	40~50kg/10a	定植前 但し、収穫75 日前まで			
リーフレタス		40kg/10a	定植前			
トマト ミニトマト		25~50kg/10a	定植前			
だいこん	ネコブセンチュウ アブラムシ類	20~50kg/10a	は種前		全面土壌混和	
	ネグサレセンチュウ					
にんにく	ネグサレセンチュウ	30~50kg/10a	植付前			
にんじん	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	20~50kg/10a	は種前			播溝土壌混和
ごぼう		20~37kg/10a				全面土壌混和
もりあざみ		40~50kg/10a		植付前 (挿苗前)		作条土壌混和
かんしょ	ネコブセンチュウ	30~40kg/10a	植付前	全面土壌混和		
やまのいも		40~50kg/10a				
さといも	ネグサレセンチュウ	40kg/10a	植付前			

2020年7月8日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カリミルを含む農薬の総使用回数
あずき	ダイズシストセンチュウ	6kg/10a	は種前	1回	作条土壌混和	1回
		30kg/10a			全面土壌混和	
だいず		6kg/10a	は種前又は定植前		作条土壌混和	
		30kg/10a	は種前		全面土壌混和	
えだまめ		6kg/10a	は種前又は定植前		作条土壌混和	
		30kg/10a			全面土壌混和	
たばこ	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	37kg/10a	定植前	作条土壌混和		