

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の 総使用回数			
稲	コブノメイガ	30 倍	3 L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	空中散布	3 回以内			
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ									
	フタオビコヤガ コブノメイガ									
麦類	ヒメビウンカ				2 回以内	2 回以内				
ばれいしょ	アブラムシ類	8 倍	1.6 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内			
ブロッコリー	アオムシ			収穫前日 まで						
キャベツ	アブラムシ類			収穫 3 日 前まで						
				収穫 7 日 前まで						
はくさい	ヨトウムシ アオムシ			収穫 21 日 前まで						
だいこん				収穫 14 日 前まで						
レタス	アブラムシ類			収穫 21 日 前まで						
ねぎ	シロイチモジヨトウ									
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ ツメクサガ			0.8 L /10a				収穫 14 日 前まで	2 回以内	2 回以内
あずき	アズキノメイガ	1.6 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	3 回以内					
しょうが	アワノメイガ									
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類		3.2 L /10a	収穫 14 日 前まで		3 回以内				