

コロマイト水和剤(第19656号)

2024年1月31日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ハダニ類 チャノホリダニ ミカンギゾウ	2000倍	500～ 700L/10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍						
りんご	ハダニ類	2000倍	400～ 700L/10a	収穫前日 まで	1回		2回以内	
なし	ハダニ類 ニセナンサビダニ							
いちじく	ハダニ類		200～	収穫7日 前まで	2回以内			2回以内
ぶどう			700L/10a					
すいか			100～ 300L/10a					
メロン								
きゅうり なす ふき								
いちご			シクラメンホリダニ	200～ 700L/10a				
さんしょう (果実)	ハダニ類							
食用ぎく			100～ 300L/10a	発生初期	2回以内			
きく		100～ 200L/10a						
ばら		100～ 500L/10a						
りんどう	100～ 300L/10a							
げっきつ	カギゾウ							

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス 室等密閉で きる場所	ハダニ類	200g/10a	20L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	常温 煙霧	2回以内
大粒種 ぶどう			150g/10a	15L/10a				