

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオブラトを含む農薬の総使用回数		
小麦	赤さび病	2000 倍	60～150 L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
未成熟 とうもろこし	紋枯病		100～300 L /10a	収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内		
キャベツ	株腐病 根朽病 灰色かび病	2000 倍			収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	菌核病								
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病								
はなやさい類	黒すす病 根朽病 菌核病								
きゅうり	灰色かび病								
	菌核病								
すいか	うどんこ病								
	つる枯病								
メロン	うどんこ病								2000～4000 倍
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病								2000 倍
	うどんこ病								2000～4000 倍
ミニトマト	灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病								2000 倍
	灰色かび病 黒枯病 斑点病								2000～4000 倍
ピーマン	うどんこ病								
	白絹病	1L/株	株元灌注						
なす	菌核病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病	2000 倍	100～300 L /10a			散布			
	灰色かび病 うどんこ病								
ししとう	黒枯病 斑点病								
	つる枯病								
かぼちゃ	うどんこ病								
にがうり ズッキーニ	うどんこ病								
オクラ	灰色かび病 うどんこ病								
いちご	輪斑病								
	しょうが							白星病	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチピラトを含む農薬の総使用回数	
らっかせい	白絹病 褐斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病							
豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く)								
だいず えだまめ	うどんこ病							
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病	1000～ 2000 倍	0.5～1L/ m <sup>2</sup>	収穫前日 まで	2 回以内	株元灌注	2 回以内	
にら	白斑葉枯病 さび病							
にら(花茎)	白斑葉枯病 さび病 白絹病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
エンダイブ	すそ枯病			収穫 7 日 前まで				
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～ 2000 倍	1L/m <sup>2</sup>	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布及び無人 航空機散布は 合計 2 回 以内)	
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病							
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒腐菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内	
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病	原液	種球重量の 0.5～1.0%	植付前	1 回	種球塗沫	4 回以内 (種球塗沫は 1 回以内、散布は 3 回以内)	
にんにく	さび病 葉枯病							
セルリー	斑点病 菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
しゅんぎく	葉枯病							
にんじん	黒葉枯病 白絹病 うどんこ病							
パセリ	うどんこ病			収穫 3 日 前まで	2 回以内			2 回以内
しそ	灰色かび病 斑点病							
しそ(花穂)				収穫前日 まで	3 回以内			3 回以内
つるな	菌核病							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペクチンオリガトを含む農薬の総使用回数	
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病	2000 倍	200~700 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病							
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病							
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病			収穫 7 日 前まで				
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニア病 黒点病 すす点病 すす斑病							収穫前日 まで
かんきつ	灰色かび病 そうか病							
かき	落葉病							
てんさい	根腐病	200~400 倍	ペーパーポット 1 冊当り 1L (3L/m <sup>2</sup> )	移植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)	
	葉腐病		100~300 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
食用さくら (葉)	うどんこ病 せん孔褐斑病	200~700 L /10a						
食用ぎく	白さび病 灰色かび病 うどんこ病		2 回以内					
きく							2 回以内	
ゆり	葉枯病 灰色かび病 うどんこ病	2000 倍	100~300 L /10a	発病初期	3 回以内	散布	3 回以内	
チューリップ <sup>o</sup>	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病							
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病							
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップ、りん どうを除く)	灰色かび病 うどんこ病							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
とうき	苗立枯病	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L) 当り0.2L	育苗期	5回以内	灌注	5回以内
とりかぶと(薬用)	白絹病	1000倍	1L/m <sup>2</sup>	生育期	3回以内	株元灌注	3回以内
たばこ	菌核病	2000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内

アフエットフロアブル (第22209号)

4/4

2024年3月27日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンチオピラトを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	うどんこ病	150g/10a	10 L /10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧	3回以内
なす		すすかび病						