

MICアディオン乳剤（第22431号）（1/5）

2023年6月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数	
なし	アブラムシ類 シクイムシ類	2000～3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
	ハマキムシ類 カメムシ類	2000倍						
もも	カメムシ類	2000～3000倍		2000～4000倍	収穫7日前まで		6回以内	6回以内
	シクイムシ類 アブラムシ類							
	モモハモクグリガ							
	ハマキムシ類							
かき	カキノハタムシガ カメムシ類 チャノキイロアサミウマ	2000～3000倍		2000倍	収穫7日前まで		5回以内	5回以内
	カキクダアサミウマ							
キウイフルーツ	キイロマイコガ	2000～3000倍		2000倍	羽化脱出期 但し収穫14日 前まで		6回以内	6回以内
	カメムシ類							
くり	クリタマハチ	1000～2000倍		2000倍	収穫14日前まで		2回以内	2回以内
	クリシキソウムシ							
かんきつ	ミカンハモクグリガ アブラムシ類	2000～4000倍		2000倍	収穫前日まで		2回以内	2回以内
	チャノキイロアサミウマ							
	カメムシ類							
いちじく	アサミウマ類 アブラムシ類	3000倍		2000倍	収穫14日前まで		3回以内	3回以内
	イチジクヒトリモトキ							
アロニア	シクイムシ類	2000～3000倍		2000倍	収穫7日前まで		5回以内	5回以内
さるなし	キイロマイコガ							
ネクタリン	カメムシ類	2000～4000倍		2000～3000倍	収穫前日まで		2回以内	2回以内
	シクイムシ類 アブラムシ類							
	モモハモクグリガ							
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ウリハムシ	2000～3000倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	6回以内 (乳剤は3回 以内、粒剤は 3回以内)		
ズッキーニ	アブラムシ類 フキノメイガ			収穫7日前まで				
にがうり	アブラムシ類 カメムシ類 タバコカスミカメ ヨトウムシ類 フキノメイガ			収穫前日まで				
すいか メロン かぼちゃ いちご	アブラムシ類			3000倍			5回以内	
ごぼう		2000～3000倍	2000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
	ヨトウムシ							
しゅんぎく	アブラムシ類	4000倍	2000倍	収穫21日前まで	2回以内	2回以内		
	ハクサイタバニ							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヘルメリン を含む 農薬の総 使用回数
だいず	マメシクイカ ^ダ アブラムシ類 フタスジ ^ダ ヒメハムシ マメハシヨウ ツメクサカ ^ダ ウコンノメイカ ^ダ カメムシ類	3000倍	100～ 300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	マメシクイカ ^ダ アブラムシ類	24倍	0.8 L/10a				
うめ	アブラムシ類	3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ピーマン		2000～3000倍	100～ 300 L/10a		5回以内		5回以内
とうがらし類	アブラムシ類	2000～3000倍		100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布
	タハコガ ^ダ	2000倍	収穫3日前まで				
キャベツ	アオムシ コガ ^ダ アブラムシ類 ヨトウムシ タナキ ^ダ ノウリハ ^ダ			2000倍	0.5 L/m ²	収穫21日前まで	2回以内
	ネリムシ類	4000～8000倍					
はくさい	アオムシ コガ ^ダ アブラムシ類 ヨトウムシ ハクサイタ ^ダ ニ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
だいこん	アオムシ コガ ^ダ ヨトウムシ ハイマダ ^ダ ラノメイカ ^ダ ダイコンハムシ			2000～3000倍	収穫30日前まで		4回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍	収穫前日まで		2回以内	4回以内 (散布は 2回以内)	
かぶ	アオムシ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
茎ブロッコリー	コガ ^ダ アブラムシ類	2000倍 2000～3000倍		収穫3日前まで	5回以内		5回以内
ブロッコリー カリフラワー			アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍	収穫前日まで	2回以内	4回以内 (乳剤は2回 以内、粒剤は 2回以内)
レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布
非結球レタス			アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍			
トレビス	アサミマ類 ネギ ^ダ コガ ^ダ ハスモンヨトウ	3000倍			3000倍	収穫7日前まで	3回以内
たまねぎ			アサミマ類 ネギ ^ダ コガ ^ダ シロイモシ ^ダ ヨトウ	2000倍			
ねぎ	アサミマ類 ネギ ^ダ コガ ^ダ シロイモシ ^ダ ヨトウ	2000倍			2000倍	3回以内	3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヘルトリン を含む 農薬の総 使用回数
ハスカップ	ハマキムシ類 アブラムシ類	2000～3000倍	200～ 700 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
にんにく	ネギコガ アブラムシ類		100～ 300 L/10a	1.6L /10a			収穫前日まで
	アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類	2000～3000倍		3回以内	3回以内	
	ヨトウムシ アブラムシ類	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫21日前まで			1回
はこべ	オオタバコガ カメムシ類	3000倍			100～ 300 L/10a	収穫14日前まで	
さやいんげん	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリハエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシクイガ		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫前日まで
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、さや いんげん、さやえ んどう、未成熟そ らまめを除く)	ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメハシヨウ	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫7日前まで	
えだまめ	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリハエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシクイガ		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫前日まで
未成熟そらまめ	ヨトウムシ類 ナモグリハエ ウラナミシジミ	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫前日まで	
さやえんどう	アブラムシ類 ハクサイタニ		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫14日前まで
ほうれんそう	ハスモンヨトウ ウリハムシトビキ アブラムシ類 アザミウマ類 コナシラミ類	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫14日前まで	
しそ	オンシツコナシラミ アブラムシ類		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫前日まで
トマト	アブラムシ類	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫前日まで	
ミニトマト	オンシツコナシラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫前日まで
なす	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫14日前まで	
ばれいしょ	アブラムシ類		3回以内	100～ 300 L/10a			収穫14日前まで
とうもろこし	アワノメイガ	3回以内			100～ 300 L/10a	収穫14日前まで	
	アブラムシ類		3000倍				

MICアディオン乳剤（第22431号）（4/5）

2023年6月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヘルメリンを含む農薬の総使用回数					
あずき	アズキノメイガ	2000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
	アブラムシ類	3000倍										
やまのいも	アブラムシ類 ヤノイモガ アザミウマ類	2000～3000倍			5回以内		5回以内					
	さといも	ハスモンヨトウ						2000倍				
さといも	アブラムシ類 スズメガ類	3000倍			2回以内		2回以内					
	さといも (葉柄)	ハスモンヨトウ						2000倍				
かんしょ	イモガ	3000倍			5回以内		5回以内					
		茶						チャノコカモンハマキ	2000倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回
茶	チャノミドリヒメコハバイ チャノホリガ チャノキイロアザミウ	2000～3000倍			1回		1回					
そらまめ	アブラムシ類	3000倍						100～300 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
オクラ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍	収穫前日まで	3回以内								
	なばな類				アオムシ コナガ							
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、非結球はくさい、みずな、なばな類を除く)	アオムシ											
こまつな	ハクサイタビ											
非結球はくさい	アオムシ				2000～4000倍							
みずな	アブラムシ類 ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ				3000倍	2回以内	2回以内					
	アオムシ											
つるむらさき	ヨウムシ				2000倍	収穫7日前まで	2回以内					2回以内
食用亜麻	ヨウガ					収穫14日前まで						
ごま	アブラムシ類 カメムシ類					3回以内	3回以内					
食用ゆり	アブラムシ類	3000倍	収穫前日まで	5回以内		5回以内						
葉ごぼう	アブラムシ類	3000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内							
はまなす (果実)	シクイムシ類	2000倍	200～700 L/10a 収穫7日前まで									

2023年6月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヘルメリンを含む農薬の総使用回数
花き類・ 観葉植物 (はぼたんを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	100～ 300 L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類	2000倍					
はぼたん	アブラムシ類	2000～4000倍					
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2000倍					
樹木類 (くちなしを除く)	ケムシ類 アブラムシ類 シャクトリムシ類	4000～8000倍	200～ 700 L/10a				
くちなし	アザミウマ類	2000倍					