

Dr. オリゼリディア箱粒剤 (第24239号)

2024年1月31日現在

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	フルリシを 含む農薬の 総使用回数	プロパザールを 含む農薬の 総使用回数	
湛水 直播 水稻	いもち病 イネドモイシ イネズゾウムシ	1kg/10a	は種時	1回	は種同時 施薬機を 用いて土中 施用する。	3回以内 (は種時までの処 理は1回以内、本 田では2回以内)	2回以内 (は種時ま での処理は1回 以内)	
稲	いもち病 イネドモイシ イネズゾウムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ		移植時		側条施用	3回以内 (直播での種時 又は移植時ま での処理は1回 以内、本 田では2回以内)	2回以内 (移植時ま での処理は1回 以内)	
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 イネドモイシ イネズゾウムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植7日前 ～移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。	3回以内 (移植時ま での処理は1回 以内、本 田では2回以内)		2回以内 (移植時ま での処理は1回 以内)
	穂枯れ(ごま 葉枯病菌)		移植当日					
	もみ枯細菌病 内穎褐変病 コメイチュウ イネメダカグリバエ イネラバエ フタホコヤガ 付ゴ類 イネトムシ		移植3日前 ～移植当日					
	穂枯れ(ごま 葉枯病菌)	移植当日						
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネドモイシ イネズゾウムシ ウカ類 ツマグロヨコバイ コメイチュウ イネメダカグリバエ イネラバエ フタホコヤガ 付ゴ類 イネトムシ	高密度には種 する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50～ 100g)	移植3日前 ～移植当日					