

水稲用殺虫剤

# エミリア<sup>®</sup>

## フロアブル

新規殺虫成分  
(フルピリミン)  
を配合!

黄金色の大地は、  
私が守る。



適用拡大  
イネドロオウムシ  
にも効く!

**ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果!**  
**地上散布のほか、少量散布、無人航空機による散布が可能!**  
**ミツバチなどの有用昆虫に影響が小さい!**



500mL

5L

# 水稲用殺虫剤

# エミリア<sup>®</sup>フロアブル



有効成分：フルピリミン…10.0% 人畜毒性：普通毒(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

- 1 新規有効成分で、既存剤に抵抗性を持った害虫にも効果を発揮!!**  
殺虫成分のフルピリミンは昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。
- 2 ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い効果を発揮!!**  
有効成分が速効的かつ持続的に作用します。カメムシ類による斑点米の被害を減らします。
- 3 ミツバチを始めとする有用昆虫に影響が小さい!!**  
ミツバチのほか、ウツキコモリグモ、ヤゴ等への影響はほとんどありません。

## 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類	1000倍	60~150ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	ツマグロヨコバイ	250倍	25ℓ/10a				
	カメムシ類	8倍	0.8ℓ/10a			無人航空機による散布	
	イネドロオイムシ						

## 試験成績



**エミリアフロアブルは各害虫に対し、高い効果が認められた。**

## 使用上の注意事項

- △ 効果・薬害等の注意**
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
  - 使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用してください。
  - 散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布してください。
  - 本剤を無人航空機による散布で使用するには次の注意事項を守ってください。
    - ① 散布液の飛散によって他の動植物等への危被害あるいは自動車の塗装などへ被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
    - ② 微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
    - ③ 各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
    - ④ 散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
    - ⑤ 散布終了後は次の項目を守ってください。
      - a) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。
      - b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は、河川等に流さないでください。
- △ 安全使用上の注意**
- 本田の水稲に対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を用いてください。
  - 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
  - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
  - 誤飲などのないよう注意してください。
  - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
  - 散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。
  - 空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
  - 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

● 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空袋・空容器は圃場や水路などに放置せず、適切に処理してください。● 防除日誌をつけましょう。

お問い合わせ/ご注文は



**三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社**

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング  
 ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>