

登録番号 第 24506 号

GP オリゼ®リディア®箱粒剤

特長：

- 田植えの忙しい時期を避けて、緑化期～移植当日までの都合の良い時に使用できます。
- 殺菌成分の「プロベナゾール」が植物体の防御機構を活性化し、いもち病に対して高い防除効果を示し、新規殺虫成分「フルピリミン」が、昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。
- ミツバチを始め、ウズキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません

GP オリゼ、リディアは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	フルピリミン・・・2.0% プロベナゾール（化管法第1種）・・・20.0%	包装	1 kg×12
性状	淡褐色～褐色細粒	有効年限	3年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害虫及び使用方法】

2023年10月25日付内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 イネノオシム イネズヅウム ウカ類 ツマゴロコハイ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	緑化期～ 移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)
	もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病) ニカメイヤ イコ類 イホラハエ イシカモグリハエ フタヒコヤ イネノムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウカ類 ツマグロヨコバイ イトメイシ イトズゾウムシ コメテウ イナゴ類 イナゴハエ イトハモグリバエ フタホコバ イトメイシ	高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内(移植時までの処理は1回以内)
稲	いもち病 イトズゾウムシ イトメイシ コメテウ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	3回以内(直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内(移植時までの処理は1回以内)
湛水直播水稻	いもち病	1kg/10a	は種時	1回	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	3回以内(は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内(は種時までの処理は1回以内)

農薬の使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせて秤量し、使い切ること。
- (2) は種時に使用する場合は、直播栽培に使用し、専用のは種同時施薬機を用いること。
- (3) 移植時に使用する場合は、次の注意事項を守ること。
 - 1) 専用の移植同時施薬機を用い、側条施用すること。
 - 2) 移植後は湛水状態(湛水深3～5 cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意すること。
 - 3) 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさけること。
- (4) 育苗箱へ処理する場合は、次の注意事項を守ること。
 - 1) 育苗箱の苗の上から所定量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤は払い落とした後、十分灌水すること。
 - 2) 稲苗の葉がぬれていると、薬剤が付着して薬害を生じる場合もあるので、散布直前の灌水はさけること。
 - 3) 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などでは薬害を生じるおそれがあるので、必ず健苗に使用すること。
 - 4) 処理苗移植の本田の整地が不均整な場合は薬害が生じやすいので、代かきはないに行い、移植後田面が露出したりしないように注意すること。
 - 5) 処理苗を本田に移植したのちは、そのまま湛水状態(湛水深3～5 cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意すること。
 - 6) 移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合には使用をさけること。
 - 7) 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理を行うこと。
 - 8) 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。
- (5) 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさけること。

- (6) 本剤の処理により、軽度の初期生育遅延や葉の黄化・褐点を認めることがあるが、その後回復するので通常の管理を維持すること。
- (7) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法-----

(1) 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法
農薬使用者に係る注意事項

- 1) 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
- 2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- 5) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
- 6) 夏期高温時の使用をさけること。

(2) 使用に際して講ずべき被害防止方法
該当なし

生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨-----

水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
また、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないこと。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

農薬の貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。