

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	70mEを含む農薬の 総使用回数				
かんきつ	シロシビダニ チャノホリダニ	2000~4000 倍	200~700 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内				
マンゴー	アザミヤ類	2000 倍									
なす ししとう	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコ ジラミを含む)	1000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内				
	アザミヤ類	1000~2000 倍									
トマト ミニトマト	トマトシビダニ	1000~4000 倍									
	アザミヤ類 タバコナジラミ類 (シルバーリーフコ ジラミを含む)	1000~2000 倍									
ピーマン	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコ ジラミを含む)	1000 倍									
	アザミヤ類	1000~2000 倍									
すいか いちご	アザミヤ類	1000~2000 倍									
はくさい	アオシ	1000 倍						1000~2000 倍	収穫 7 日前 まで	2 回以内	2 回以内
	コガ	1000~2000 倍									
キャベツ	アザミヤ類	1000 倍						1000~2000 倍	収穫 3 日前 まで	2 回以内	2 回以内
	アオシ										
ブロッコリー カリフラワー	アザミヤ類	1000 倍	1000~2000 倍	収穫 14 日前 まで	2 回以内		2 回以内				
	コガ										
だいこん	アザミヤ類	1000~2000 倍	100~800 L/10a	収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内				
にら	アザミヤ類										
アスパラガス	アザミヤ類 タバコナジラミ類 (シルバーリーフコ ジラミを含む)	2000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内				
わけぎ あさつき	アザミヤ類										
ねぎ	ネハモグリハエ	1000~2000 倍	100~300 L/10a	収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内				
たまねぎ	アザミヤ類										
にんにく	アザミヤ類	2000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	2 回以内					
きく (葉)				収穫 3 日前 まで							
しそ				収穫前日 まで	3 回以内	3 回以内					
バジル				収穫 14 日前 まで	2 回以内	2 回以内					
ほうれんそう											
しよくよう ほおずき				収穫前日 まで	2 回以内	2 回以内					

2023 年 8 月 23 日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液 量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用 方法	フロトキンを 含む農薬の 総使用回数
みょうが (茎葉)	アザミヤ類	1000 倍	100～ 300 L/10a	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合に あつては開 花期終了 まで	3 回以内	散布	3 回以内
みょうが (花穂)				収穫前日 まで		散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィルム 被覆によ り散布液 が直接花 穂に飛散 しない状 態で使用 する。	
しそ(花穂)				収穫 3 日 前まで		2 回以内	
食用ぎく		2000 倍					
茶	チャホガ	2000～4000 倍	200～ 400 L/10a	摘採 14 日 前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	チャノキアザミ マ	1000～4000 倍					
きく	アザミヤ類	2000 倍	100～ 300 L/10a	発生初期			
グロリオサ		1000 倍					
ほおずき		2000 倍					