2022 年 10 月 26 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病	1000～1500 倍	200～700L/10a	収穫前日まで	6 回以内 (但し、開花期以降散布は 3 回以内)	散布	8 回以内 (液剤及び水和剤は合計 6 回以内 (開花期以降は 3 回以内)、 塗布剤は 2 回以内)
	黒点病	1000 倍					
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病	1500 倍		収穫 14 日前まで	5 回以内		5 回以内 (塗布剤は 2 回以内、 液剤は 1 回以内)
すもも	灰星病	2000 倍		収穫 3 日前まで	3 回以内		3 回以内
うめ	黒星病 灰色かび病 すす斑病			収穫 30 日前まで			
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	灰星病						
おうとう		1000～2000 倍		収穫 7 日前まで			
もも	灰星病 ﾎﾓﾌﾟｼｽ腐敗病 黒星病			収穫前日まで			3 回以内 (休眠期は 1 回以内)
ﾈｸﾀﾘﾝ		1500～2000 倍			2 回以内		2 回以内
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000 倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～2000 倍					
	灰色かび病	10 倍					
	灰色かび病	20 倍	4L/10a	収穫 3 日前まで		無人航空機による散布	
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10 倍	8L/10a				
	貯蔵病害(青かび病)	20 倍	5L/10a				
	貯蔵病害(緑かび病) そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病	1000 倍	10L/10a				
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病)	1000～2000 倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
	実炭疽病	1000 倍					

2022 年 10 月 26 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝを含む農薬の総使用回数
くり	菌核病	1000 倍 8 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
ｷｬﾍﾞﾂ	黒葉枯病 うどんこ病 斑点病 菌核病			収穫 28 日前まで	5 回以内		5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、無人航空機散布は 2 回以内)
にんじん	斑点病			収穫 14 日前まで			
	灰色かび病	1000 倍	2L/10a		2 回以内	無人航空機による散布	
らっきょう	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内
たまねぎ	炭疽病 うどんこ病 菌核病 つる枯病	1000 倍 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	5 回以内	散布	5 回以内
すいか	うどんこ病 菌核病 つる枯病				4 回以内		4 回以内
ﾒﾛﾝ	うどんこ病				5 回以内		5 回以内
かぼちゃ	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病			収穫 7 日前まで	4 回以内		4 回以内
きゅうり	うどんこ病	4000 倍		収穫前日まで	7 回以内		7 回以内
にがうり	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病	2000 倍			3 回以内		3 回以内
なす	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病	2000～ 4000 倍					
ﾄﾏﾄ	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すすかび病 斑点病	4000 倍					

2022 年 10 月 26 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝを含む農薬の総使用回数
ﾐﾆﾄﾏﾄ	炭疽病 うどんこ病 輪斑病	1000 倍			2 回以内		2 回以内
いちご	うどんこ病	2000～4000 倍	100～300L/10a	育苗期(定植前)	5 回以内	散布	10 回以内(育苗期は 5 回以内、本圃では 5 回以内)
	灰色かび病 炭疽病 黒斑病	2000 倍		収穫前日まで(生育期)			
	褐斑病 斑点病	1000 倍					
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ	斑点病	8 倍		収穫開始 7 日前まで			5 回以内
	炭疽病 葉渋病	1000 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
やまのいも	葉渋病	12 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	5 回以内(種いもへの処理は 1 回以内、無人航空機散布は 3 回以内)
	青かび病	200 倍	3L/10a		3 回以内	無人航空機による散布	
やまのいも(むかご)	青かび病 炭疽病 新梢枯死症 輪斑病	200 倍 1500～2000 倍	-	植付前	1 回	1～10 分間種いも浸漬	1 回
茶	青かび病	100 倍	200～400L/10a	摘採 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
ｱｲﾘｽ	青かび病 褐色斑点病	200 倍	-	植付前	1 回	10 分間球根浸漬	8 回以内
		1000 倍				30 分間球根浸漬	
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ			100～300L/10a	発生初期	8 回以内	散布	

作物名	適用病害虫名	適用場所	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝを含む農薬の総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等密閉できる場所	150mL/10a	10L/10a	収穫前日まで	7 回以内	常温煙霧	7 回以内
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病					3 回以内		3 回以内