

アニキ[®] 乳剤



タバココナジラミ

マメハモグリバエ

ハスモンヨトウ

オオタバコガ

コナガ

虫にキビしく、作物にやさしい。



作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数	レピメクチンを含む 農薬の総使用回数
だいず		2000~3000倍				
えだまめ						
豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやえんどうを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍				
さやえんどう	ハモグリバエ類	1000倍				
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	2000~3000倍				
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍				
いちご	オオタバコガ	1000~2000倍				
トマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、トマトサビダニ	2000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内
ミニトマト	コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ	1000~2000倍				
ピーマン	コナジラミ類					
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、チャノホコリダニ	2000倍				
とうがらし類	コナジラミ類	1000~2000倍				
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、チャノホコリダニ	2000倍				
なす	ハスモンヨトウ、コナジラミ類	1000~2000倍				
	オオタバコガ、ハモグリバエ類、チャノホコリダニ	2000倍				
きゅうり	コナジラミ類	1000倍				
	ハスモンヨトウ	2000倍				
すいか	オオタバコガ	1000倍				
メロン	ハモグリバエ類、コナジラミ類	2000倍			4回以内	4回以内
ほうれんそう	ハスモンヨトウ					
キャベツ	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ ウバ類、オオタバコガ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a			
	シロイチモジヨトウ	2000倍				
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ オオタバコガ、カブラハバチ類	1000~2000倍		収穫3日前まで		
	キスジノミハムシ、ダイコンハムシ	1000倍				
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍				
ブロッコリー	コナガ、ハスモンヨトウ、アオムシ、シロイチモジヨトウ					
カリフラワー	コナガ、ハスモンヨトウ					
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ、ハスモンヨトウ、キスジノミハムシ、ハモグリバエ類	1000~2000倍		収穫前日まで		
レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ			収穫3日前まで		
非結球レタス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ					
アスパラガス	コナジラミ類	1000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内
	ハスモンヨトウ	2000倍				
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ	1000~2000倍				
	ネギアザミウマ、ハモグリバエ類	1000倍				
だいごん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類	1000~2000倍				
たまねぎ	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	2000倍				
かぶ	コナガ	1000倍				
	キスジノミハムシ	2000倍				
未成熟とうもろこし	オオタバコガ、ツマジロクサトウ	1000倍				
	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで		
ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍				
しそ(花穂)	ハスモンヨトウ					
しそ	ハスモンヨトウ、シンサビダニ	2000倍				
しそ科葉菜類(しそを除く)	ハスモンヨトウ					
セルリー						
茶	チャノコカクモンハマキ	1000~2000倍	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	2回以内
みかん	ミカンハモグリガ					
	チャノキイロアザミウマ、アゲハ類	1000~4000倍		収穫前日まで		
	ミカンサビダニ	2000~4000倍				
	チャノホコリダニ	4000倍				
かんきつ(みかんを除く)	ミカンハモグリガ	1000~2000倍	200~700ℓ/10a		4回以内	4回以内
	チャノキイロアザミウマ、アゲハ類	1000~4000倍		収穫3日前まで		
	ミカンサビダニ	2000~4000倍				
	チャノホコリダニ	4000倍				
食用ぎく	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内
きく(葉)				収穫3日前まで		
きく	マメハモグリバエ	1000倍				
	オオタバコガ、ハスモンヨトウ					
カーネーション	オオタバコガ	1000~2000倍		発生初期	6回以内	6回以内
ストック	コナガ					
りんどう	リンドウホソハマキ		100~300ℓ/10a			
食用金魚草、食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア、食用パンジー	ハスモンヨトウ	2000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内

●使用前には、ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記載しましょう。

